

Spätfolgen am Harnsystem
nach Beckenbrüchen
mit Harnröhrenzerreißungen



INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der Hohen Medizinischen Fakultät der
Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität
zu Bonn.



Vorgelegt am 24. April 1937

von

JOHANNES BARTH

Arzt

aus Duisdorf.

Anton Brand, Bonn
Bonn 1937

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Bunge
Korreferent: Prof. Dr. Freiherr v. Redwitz.



Zu den gelegentlich folgenschweren Komplikationen des Beckenbruchs gehören die Verletzungen der Harnröhre. Manchmal sind die Harnröhrenverletzungsfolgen derartig schwer, daß durch dieselben eine erhebliche Minderung der Erwerbsfähigkeit bedingt wird, wenn die Folgen des Beckenbruchs selbst schon vollständig ausgeheilt sind, eine Erwerbsbeschränkung überhaupt nicht mehr vorliegt.

Handelt es sich um Verletzungen geringen Grades ohne ausgedehnte Zerreißen (betrifft die Verletzung nur einen kleinen Teil des Harnröhrenumfanges), so ist die Prognose meist eine günstige. Es gelingt in solchen Fällen den Katheterismus der Blase auszuführen und damit ist zunächst die Hauptgefahr beseitigt. Läßt man den Katheter mehrere Tage liegen unter Darreichung von Harn-desinfizienten, so läßt sich auch die Blaseninfektion, die beim Dauerkatheterismus stets droht, in engen Grenzen halten. Bei solchen unvollständigen Einrißen der Harnröhre kommen Spätfolgen nur selten zur Beobachtung, wenn nicht durch die Blaseninfektion weitere Folgen ausgelöst werden. In solchen Fällen aber muß nach Entfernung eines evtl. eingelegten Dauerkatheters der Verletzungsstelle die größte Aufmerksamkeit gewidmet werden, um gegebenenfalls davon ausgehende Eiterungen sofort zu bekämpfen.

Daß aber auch bei leichten Verletzungen der Harnröhre die Gefahr der späteren Verengung besteht, beweist folgende Beobachtung, bei der die Harnröhrenverletzung nicht durch Beckenbruch hervorgerufen war. Verkehrsunfall. Unterschenkelbruch und Quetschung der Harnröhre. Heilung des Unterschenkelbruchs ohne Besonderheiten. Bei der Krankenhausaufnahme entleeren sich aus der Harnröhre einige Tropfen Blut, Blasenentleerung nicht gestört. Katheter und Bougie Charr. 24 lassen sich glatt einführen. Bei Einführung Schmerzhaftigkeit an der Verletzungsstelle unterhalb der Symphyse. Bei der Entlassung Harnröhre für Charr. 24 glatt durchgängig. Auf Veranlassung der Haftpflichtgesellschaft ein halbes Jahr nach der Entlassung Untersuchung von anderer Seite. Harnröhre nur für Charr. 19 durchgängig. Spätere Untersuchung durch Prof. Bunge ergibt Durchgängigkeit für knapp Charr. 18. Bougiekur empfohlen. Weiterer Verlauf unbekannt.

Wie schwer und mannigfaltig bei vollständiger Zerreißen der Harnröhre die Spätfolgen sein können, soll in den folgenden Ausführungen dargelegt werden.

Vorerst aus dem Schrifttum einige Zahlen über Beckenbrüche mit vollständiger Harnröhrenzerreißung unter Berücksichtigung der Mortalität.

K a u f m a n n an der Kocher-Klinik zählte bei Harnröhrenzerreißung mit Beckenbruch eine Sterblichkeit von 40%.

Die Amerikaner S m i t h und M i n z hatten bei 13 Harnröhrenrupturen mit Beckenbrüchen eine Sterblichkeit von 61%.

In jüngerer Zeit sank die Sterblichkeitsziffer.

P a a l (1931) hatte bei Beckenbrüchen mit gleichzeitiger Harnröhrenzerreißung bei Untersuchung über 5 Jahre eine Gesamtsterblichkeit von 32%.

H a n s e n, dessen Veröffentlichung „Erfahrungen und Ergebnisse bei Verletzungen der Harnwege“ (1934) in diesem Zusammenhang wegen der Größe des beobachteten und behandelten Krankengutes und wegen der umfassenden Darstellung der Endresultate der Harnröhrenverletzungen besondere Beachtung verdient, gibt eine Sterblichkeitsziffer von fast 29% an, wobei sich allerdings nicht immer urfächlich der Beckenbruch findet und auch leichtere Verletzungen der Harnröhre mit einbezogen sind. Er konnte durch die Kontrolluntersuchungen für Sektion II der Knappschafts-Berufsgenossenschaft Bochum im Verlauf von 10 Jahren das Schicksal von 127 Harnröhrenverletzten am Krankenhaus „Bergmannsheil“ in Bochum unter Leitung von Prof. M a g n u s und 8 Harnröhrenverletzten an der Lexer'schen Klinik in München im Verlauf von 5 Jahren verfolgen, dessen Kenntnis für die Begutachtung und Feststellung einer evtl. Dauerrente wichtig ist.

Wegen der Schwierigkeit, die Art der Harnröhrenverletzung in allen Fällen festzustellen (ob vollständige oder unvollständige Zerreißung), ging H a n s e n bei seinen Untersuchungen von der Art der Behandlung aus und führt an:

1. Die abwartende Behandlung, mit oder ohne Dauerkatheter,
2. Die operative Behandlung mit Sectio alta (hohem Blasenchnitt) und Sectio profunda (tiefem Harnröhrenschnitt),

Von Verletzungen mit Harnröhrenblutungen verliefen 3 ohne Katheterbehandlung günstig, ohne Spätfolgen zu hinterlassen.

Bei sämtlichen übrigen Verletzten kam es schon meist in den ersten Tagen zu Infektionsercheinungen: Urethritis, Cystitis, Pyelitis, Orchitis und Epididymitis und einige Male auch zur Pneumonie. Nach Entfernung des Dauerkatheters verschwand auch das „Katheterfieber“, das stets solche Infektionen begleitet.

Von 24 der ersten großen Gruppe, die mit Dauerkatheter behandelt wurden und bei denen es nicht zu Urinphlegmonen kam, bezogen 16 über 2 Jahre eine Rente in Höhe von 10—30%, da der Urinbefund Eiweiß,

Erythrocyten und Leucocyten zum Teil auch Bakterien aufwies. Bei verschiedenen Verletzten traten Dauer Schäden auf in Form doppelseitiger Hodenatrophie, 5mal kam es zu Potenzstörungen, 4mal zur Veränderung der Prostata, 5mal zur Verengerung der Harnröhre, 1mal zur Thromboisierung von Gefäßen des Beckens und des prävesikalen Raumes, 4mal zu pyelonephritischen Veränderungen, 1mal zur doppelseitigen Hydro-nephrose 2mal zur einseitigen und 1mal zur doppelseitigen Schrumpfniere. Als völlig geheilt konnten nur 4 Verletzte betrachtet werden.

Wegen akuter Harnverhaltung längere Zeit nach der Verletzung wurde in 2 Fällen operativ eingegriffen, 1mal zeigte sich noch lange ein krankhafter Urinbefund, im anderen Falle schloß sich eine langjährige Bougiebehandlung an.

Bei 11 der zweiten großen Gruppe, die mit Dauerkatheter behandelt wurden, kam es zu Urinphlegmonen. Dem schweren klinischen Verlauf entsprechend waren auch die Endergebnisse ungünstig. Nur in 3 Fällen war der Urinbefund normal. Mehrere Male traten Potenzstörungen ein. Als Dauerzustand fand sich 1mal eine wesentliche Verengerung der Harnröhre, 1mal noch nach 4 Jahren eine Knochenfistel, 2mal kam es zu Harnröhrenfisteln, die noch nach 4 bzw. 5 Jahren bestanden, 4mal zu pyelonephritischen Veränderungen, 1mal zur einseitigen und 1mal zur doppelseitigen Schrumpfniere, 1mal fand sich nach 12 Jahren noch ein Harnröhrendivertikel. Inkontinenzerscheinungen kamen bei der Gruppe mit abwartender Behandlung nicht zur Beobachtung.

In der ersten großen Gruppe der operativ mit Sectio alta behandelten Verletzten, wozu wohl die schwersten Fälle gehören, fanden sich 44. Davon starben 4 an den Spätfolgen.

1. starb nach 6 Jahren mit doppelseitiger Retinitis, 12 % Eiweiß und Blutdruck R.R. 280 mm Hg.
2. starb nach 5 Jahren an Schrumpfniere.
3. starb 8 Monate nach der Operation. Nach Sektionsbericht hatte er 2 Fisteln, eine chronisch-eitrige doppelseitige Pyelonephritis mit ausgedehnter Steinbildung, Perinephritis und Hämofiderose von Blasen- und Beckenbauchfell.
4. starb nach 2 Jahren an Urämie.

32 wiesen einen krankhaften Urinbefund auf. Bei 22 traten schwere Urinphlegmonen auf. 22mal kam es zu Potenzstörungen, 15mal zu Verengerungen der Harnröhre, 7mal zu Inkontinenzerscheinungen, 3mal zu Harnröhrenfisteln, 2mal zu sicheren und mehrmals zum Verdacht auf Harnröhrendivertikel. Von 20 wurden Ausscheidungs-pyelogramme angefertigt. Sämtliche wiesen erhebliche pyelonephritische Veränderungen auf, außerdem fanden sich 8mal einseitige und 1mal doppelseitige Steine, 5mal lag eine einseitige und 3mal eine doppelseitige Schrumpfniere vor.

Mit Sectio profunda (äußerer Harnröhrenschnitt) wurden 16 Verletzte behandelt. Bei 6 kam es im Verlauf der Behandlung zu Urinphlegmonen. 5 wiesen krankhafte Harnbestandteile, 4 pyelonephritische Veränderungen auf, dabei 3 mit Erweiterung beider Harnleiter, außerdem 1mal ein einseitiger Stein und 1mal ein doppelseitiger Ausgußstein. 1mal kam es zu Inkontinenz mit chronischer Orchitis und Epididymitis. 3mal fanden sich als Spätfolgen Strikturen und 3mal Fisteln.

Der Zusammenhang zwischen Beckenbrüchen und Harnröhrenverletzungen wird klar, wenn man bedenkt, daß 83 % von den von H a n f e n angeführten Harnröhrenverletzungen mit Beckenbrüchen vergesellschaftet sind. Dem Röntgenbild kommt daher bei Harnröhrenverletzungen erhöhte diagnostische Bedeutung zu, zumal da klinisch bei Vorhandensein von großen Hämatomen die Feststellung eines Beckenbruchs wegen des Fehlens der Dislokation oft unmöglich ist.

Unter der großen Zahl von Unfallverletzten, die Prof. B u n g e von der Sektion I der Knappschafts-Berufsgenossenschaft Bonn zur Verfügung stand und von der er besonders bei schwierig gelagerten Fällen zur Begutachtung und zur Behandlung zugezogen wurde, befand sich eine erhebliche Anzahl von Verletzten, die Beckenbrüche und Harnröhrenverletzungen aufwiesen und nachfolgende Veränderungen der Harnwege. Das in Bezug auf das spätere Schicksal der Verletzten interessante Beobachtungsmaterial wurde mir von Herrn Prof. B u n g e zur Bearbeitung überlassen. ¹⁾

Wegen der oft gleichartig gelagerten Beobachtungs- und Behandlungsfälle im Hinblick auf die eingetretenen Spätfolgen habe ich aus dem großen dargebotenen Material einige bezeichnende und typische herausgestellt, durch die die Spätverletzungsfolgen besonders klar vor Augen geführt werden. Bei Nachuntersuchungen konnte ich mich von den schwerwiegenden Folgen der meisten hier angeführten Fälle überzeugen.

Da Prof. B u n g e aus örtlichen Gründen keine Frühfälle sofort nach der Verletzung oder bald nach derselben überwiesen bekam

1) Der Knappschafts-Berufsgenossenschaft Bonn, von der mir die Akten in zuvorkommender Weise zur Verfügung gestellt wurden, spreche ich an dieser Stelle meinen Dank aus.

sondern nur Spätfälle im weiteren Verlauf nach den Verletzungen, so können prozentualische Angaben über Häufigkeit der Spätfolgen an Hand des beobachteten und behandelten Krankengutes nicht gemacht werden, da nicht das gesamte Verletzungsmaterial der Sektion I der Knappschafts-Berufsgenossenschaft herangezogen werden konnte.

Ich lasse zunächst eine Auswahl der Krankengeschichten folgen, um dann an Hand derselben auf die Spätfolgen näher einzugehen.

I. F. F., Hauer, 33 Jahre, Unfalltag: 14. 12. 12.

Beim Heben eines Steines auf das Gefäß gefallen. Unmittelbar darauf Blutaustritt aus der Harnröhre. In der rechten unteren Schambeingegend starke Druckschmerzhaftigkeit an umschriebener Stelle. Nach einigen Tagen Wohlbefinden, starke Blutungen aus der Harnröhre und Brennen beim Wasserlassen. F. verläßt das Krankenhaus, da er der Verletzung nicht viel Beachtung beilegt.

6. I. 13 wegen erneuter Harnröhrenblutung in Krankenhausbehandlung. Vorgeschlagene Operation abgelehnt. 27. I. 13 arbeitsfähig entlassen.

1914 in Metz wegen behinderter Urinentleerung und Blutungen behandelt.

1914/15 als Armierungssoldat wegen Strikturbeschwerden und Harnröhrenblutungen entlassen.

Seit 1913 Urinentleerung nur in dünnem Strahl, Wasserlassen oft nur tropfenweise möglich. Es wechselten beschwerdefreie Zeiten mit starken Tenesmen und Schmerzen in der Harnröhre.

Anfang 1917 als Hilfsdienstpflichtiger wegen der gleichen Beschwerden — damals angeblich auch schon unfreiwilliger Urinabgang — in Lazarettbehandlung.

In der Chirurgischen Klinik Bonn Feststellung einer Striktur in 6 cm und einer zweiten in 15 cm Entfernung vom Orificium externum. An dieser letzten Stelle vom Damm aus dicke Schwielen fühlbar, Bougierung. Im Laufe der Behandlung rechtsseitige Hoden- und Nebenhodenentzündung, auf Incision am 5. 9. 17 Entleerung geringer Mengen seröseitriger Flüssigkeit. Bougierung bis Charr. 22.

22. 12. 17 äußerer Harnröhrenschnitt und Spaltung der Striktur. Bei der Operation Feststellung eines falschen Weges, daher Sectio alta. Dauerkatheter 20. Lernt sich selbst bougieren.

5. 11. 19 bis 26. I. 20 im Krankenhaus zu Neuwied wegen schweren Blasenkatarrhs mit eitrigem Urin (Streptococci und Coli-Bazillen, keine Gonococci), Urinentleerung nur tropfenweise. Wegen unfreiwilligen Urinabgangs Urinal. Behandlung mit Bougierung.

19. 11. 21 Zunahme der Strikturen, Erweiterung bis Charr. 13 möglich. Bei weiterer Behandlung Schüttelfröste.

3. 2. 23 erneute Operation von der Blase aus in der Chirurgischen Klinik zu Bonn.

1926 wegen vollkommener Harnverhaltung in Neuwied operiert. Resektion des fast vollkommen obliterierten Harnröhrenteils mit nachfolgender schwieriger Naht. Dauerkatheter. Nach der Operation Harnfistel und erneute Verengung. Seitdem dauernd in ärztlicher Behandlung wegen Harnröhrenverengung.

Zwecks Feststellung, ob gonorrhöische Ätiologie vorliegt, Untersuchung in der Hautklinik Bonn vom 13. 6. bis 20. 6. 29. Keine Gonorrhöe nachweisbar, vordere Striktur wahrscheinlich gonorrhöischen Ursprungs. Zweite Striktur urfächlich auf Unfall zurückgeführt. Verengung für Bougie Charr. 3 bis 5 durchgängig. Schwer eitriges Blasenkatarrh (Coli-Bazillen und Staphylococcen).

1930 Behandlung in Wildungen. Urinfistel am Damm, zeitweilig Fieber und Schüttelfröste, allmähliche Erweiterung bis Charr. 18. Nach Rückkehr dauernd in ärztlicher Behandlung.

1931 Untersuchung im Johanniter-Krankenhaus. Kirschgroßes paraurethrales Infiltrat, spontaner Aufbruch mit Eiterentleerung. Harnstrahl dünn und gewunden, Urin stark eitrig. Bougierung wegen Abszeßbildung nicht möglich. Operative Behandlung abgelehnt. Bei der Entlassung Fistel geheilt, schwerer Blasenkatarrh unverändert. Striktur für Bougie Charr. 6 durchgängig. In der Heimat ständig in Behandlung.

1932 und 1933 Striktur und Urinbefund unverändert. Röntgenaufnahme der Harnröhre mit Kontrasteinspritzung ergibt: Hochgradige Striktur im hinteren Harnröhrenteil mit teilweiser ampullenartiger Erweiterung im vorderen Teil. Urinentleerung teils in gewundenem kraftlosen Strahl, teils tropfenweise.

1935 wegen rechtsseitiger Nierenkoliken erneute Untersuchung im Johanniter-Krankenhaus. Urinbefund unverändert. Harnröhre jetzt für Bougie Charr. 7 bis 10 leicht, für Charr. 12 schwer durchgängig. Intravenöses Urogramm ergibt: Linke Niere erheblich vergrößert, sonst o. B. An Stelle der rechten Niere unregelmäßig gebuckelter Schatten. Urosekretanausscheidung an der Stelle der Niere überhaupt nicht erkennbar. Weder eine Andeutung von Füllung der Kelche oder des Nierenbeckens noch Kontrastmasse im Harnleiter nachweisbar. Im Röntgenbild kein Stein. Blasenpiegelung und Harnleiterkatheterismus nicht ausführbar. Blutharnstoff nüchtern $0,38^{0/100}$, nach Belastung $0,50^{0/100}$.

Vorübergehende Besserung durch Kur in Wildungen.

Zwecks Entscheidung der Frage, ob Entfernung der rechten Niere ausführbar ist, erneute Untersuchung im Johanniter-Krankenhaus. Blut-

druck R.R. 135/95 mm Hg. Im Urin 1^{0/00} Eiweiß, zahlreiche Leucocyten, Erythrocyten und Coccen in mäßiger Menge. Indigocarmin intravenös wird nach 5 Minuten in der Blase festgestellt, nach 7 Minuten stark blau. Nach Harnstoffzufuhr höchste Konzentration im Blasenurin 18^{0/00}. Blutharnstoff nüchtern 0,347^{0/00}, nach Harnstoffbelastung 0,496^{0/00}. Nach diesem Befund erschien Entfernung der rechten Niere erlaubt.

29. 4. 36 Behandlung in Wildungen. Jetzt Steinschatten in der rechten Niere nachweisbar. 4. 5. 36 Operation in Periduralanästhesie. Schon im Beginn der Operation Kollaps. Im rechten Harnleiter Stein an der Kreuzungsstelle mit den Iliacalgefäßen. Stein nicht entfernt (schwere Periureteritis), Fortsetzung der Operation in Äther-Narkose. Entfernung der rechten Niere, die durch starke perinephritische Verwachsungen schwer zugänglich ist. Nach der Operation Kollaps. Nach vorübergehender Besserung Tod am 8. 5. 36.

Mikroskopische Untersuchung der operativ entfernten rechten Niere ergab: Typische, entzündlich-hydronephritische Schrumpfniere mit fast völlig verödetem Glomeruli und dichten Entzündungsinfiltraten, in dem auch sonst fast vollkommen durch Schwielenewebe ersetzten Parenchym. Nierenbeckengewebe ersetzt durch ein altes, von Entzündungszellen aller Art durchsetztes Granulationsgewebe, in dem sich auch reichlich Fett abgelagert hat.

Bei F. wurde eine Reihe von Operationen an den abführenden Harnwegen ausgeführt, auch mehrfach versucht, einige von der Harnröhre ausgehende Dammfisteln operativ zu entfernen. F. war ferner genötigt gewesen wegen der bestehenden Harnröhrenverengung sich regelmäßig zu bougieren. Es war zu einer Harninfektion gekommen und zum chronischen Blasenkatarrh. Die Infektion stieg zum Nierenbecken auf. Auf Grund verschiedener Eingriffe kam zu der Harninfektion eine Beckenbindegewebsentzündung mit Einschluß von Prostata und Samenblase. Wie die Operations- und Sektionsbefunde ergaben, war diese Beckenbindegewebsentzündung vorzugsweise auf die rechte Seite lokalisiert. Dies führte zur Einmauerung des rechten Ureters in derbes Schwielenewebe, zur Einengung seines Lumens und zur Behinderung der Funktion der Niere und des Harnleiters. Dazu kommt, daß sich in der schon verstopften und infizierten rechten Niere, vielleicht auch im Ureter, Steine bildeten, die wegen der eben geschilderten Veränderungen nicht abgehen konnten bzw. die Verstopfung der Niere vollständig machten und zum völligen Untergang des Organs führten.

2. P. F., Schlepper, 17 Jahre, Unfallstag: 1. 9. 20.

Beim Überschreiten des elektrischen Bahngleises geriet F. zwischen Maschine und Streckenstoß. Bei der Aufnahme ins Krankenhaus „Bethanien“ Schmerzen in der Kreuzbeingegend und in der Harnröhre. Selbsttätige Urinentleerung unmöglich. Der durch Katheter entnommene Urin zuerst blutig, dann klar. Diagnose: Bruch beider Schambeinäste links (Röntgenbild) und Harnröhrenverletzung. 11. 10. 20 gegen ärztlichen Rat eigenmächtiges Verlassen des Krankenhauses. Seit dieser Zeit wurde die Harnröhre nicht mehr bougiert.

April 1921 keine Verhärtung im Laufe der Harnröhre am Damm. Wasserlassen in regelrechtem Strahl, Urin frei von krankhaften Formbestandteilen.

Vom 30. 10. bis 9. 12. 22 und vom 7. 11. bis 26. 11. 26 wegen Harnröhren- und Blasenkrankung in Behandlung des Revierarztes. Die Beschwerden beim Wasserlassen wurden immer stärker, so daß der Urin nur in dünnem Strahl entleert werden konnte.

6. 8. 30 plötzlich vollkommene Harnverhaltung. Katheterisierung unmöglich. Durch tiefen Blasenschnitt gelang es nur, das untere Ende der Striktur aufzufuchen. Eine Spaltung der Strikturstelle mißlang wegen starker Verwachsungen und völliger Verlegung der Lichtung. Darauf hoher Blasenschnitt. Entleerung der fast bis zum Nabel gefüllten Blase. Retrograde Sondierung von der Blase aus, wie auch Spaltung gelang nicht, weil die Harnröhre in einer Ausdehnung von 3 cm völlig verschlossen war. Es wurde nun ein Dauerkatheter von der Blase aus durch den oberen und unteren offenen Teil der Harnröhre gelegt unter Unterbrückung des verschlossenen Teils der Harnröhre. Tägliche Bougierung. In den letzten Tagen des Krankenhausaufenthaltes heftige Schmerzen in beiden Nieren, danach Abgang von erbsengroßem Harngries. Das Röntgenbild ergab keinen deutlichen Schatten von Nierensteinen. Urin fast klar, neutrale Reaktion.

Seit 12. 1. 31 schwere Nierensteinkoliken. Es sollen Steine durch die Harnröhre entleert worden sein.

Daraufhin wurde er am 15. 1. wegen Nierensteinkoliken, besonders rechts, ins Krankenhaus aufgenommen. Nach Abgang von 12 Steinen besserte sich der Zustand. Danach befand sich der Patient dauernd in ärztlicher Behandlung.

1. 5. 31 entstand im Anschluß an Bougierung mit Delamottebougie, die glatt verlief, eine völlige Inkontinenz der Blase. Beschaffung eines Urinals nötig.

Da die Frage auftaucht, ob es sich bei F. um Unfallfolgen oder um die Folgen einer gonorrhöischen Erkrankung handelt, wird von Prof. Hoffmann (Bonn) der Zusammenhang geprüft. F. verneint, jemals

an Tripper erkrankt zu sein. Der Unterfucher kommt zu dem Urteil, daß bei F. ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Unfall und Striktur besteht, die Striktur eine Folge des erlittenen Unfalls darstellt, nicht Folgeerscheinung einer gonorrhöischen Infektion.

24. 7. 31 auf Aufforderung, Wasser zu lassen, entleert F. anscheinend ohne Gefühl nach 5 Minuten 100 Gramm Urin. Bougierung mit Charr. 19 gelingt mit einiger Schwierigkeit, da die Harnröhre am Blasen Hals verzogen ist. Der Urin klar, sauer, frei von Eiweiß. Linke Niere druckempfindlich.

Zwecks Klärung der Frage, ob die Nierensteinbildung mit dem Unfall in Zusammenhang stehe, erfolgt Krankenhausaufnahme am 7. 12. 31 und Untersuchung durch Prof. Bunge. Blutdruck R.R. 150/90 mm Hg. Im Schleuderpräparat finden sich kleine Mengen Schleim, keine Leucocyten und Bakterien, aber zahlreiche harnsaure Salze. In der Gegend zwischen beiden Harnleitern stärkere Schleimauflagerungen. Der durch Harnleiterkatheterismus getrennt aufgefangene Urin ist beiderseits klar, krankhafte Formbestandteile und Bakterien fehlen. Im Röntgenbild Nierensteine nicht nachweisbar, auch nicht in den Harnleitern. Die Harnstoffkonzentration beträgt beiderseits 25^{0/00}. Da der Urin bakterienfrei, so kann die Steinbildung nicht als Spätfolge des Unfalls anerkannt werden.

31. 1. 33 Harnröhre gut für Bougie Charr. 21 durchgängig. Urin klar, sauer, ohne Eiweiß. Im Sediment zahlreiche hyaline Zylinder, keine sonstigen Formelemente. F. ist jetzt in der Lage, 50 Gramm Urin freiwillig zu lassen.

13. 10. 33 Blutdruck R.R. 125/75 mm Hg. Auf Aufforderung die Blase nach Möglichkeit zu entleeren, entleert er 17 ccm in schneller Tropfenfolge, weitere 13 ccm durch eingeführten Katheter. In der Gegend der Harnröhrenverengung gelingt die Durchführung ohne Schwierigkeit nach leichter spiraliger Drehung. Die Blase faßt bequem 100 ccm, dann erst Klagen über leichten Blasendruck. Die Blasenschleimhaut weist keine Entzündungserscheinungen an den Harnleitermündungen auf. Intravenös eingespritztes Indigocarmin wird beiderseits nach 4 Minuten in kräftigem Blaustrahl ausgestoßen. Blutharnstoff nüchtern 0,24^{0/00}, 24 Stunden nach Harnstoffbelastung 0,48^{0/00}. Nach Einspritzung von Urofektan B normale Nierenschatten. Urin gegen früher unverändert, jetzt aber ohne Zylinder. Regelmäßige Bougierung notwendig.

21. 11. 35 bei Anspannung der Bauchpresse Urinabgang in beschleunigter Tropfenfolge. Harnröhre läßt sich ohne Schmerzen steigend mit Metallbougie bis Charr. 25 bougieren. Während bei der letzten Untersuchung der Urin frei von Eiweiß und krankhaften Formbestandteilen gefunden wurde, fanden sich jetzt Leucocyten und Eitererreger in beschränkter Zahl und eine der Leucocytenbeimengung entsprechende Menge

von Eiweiß, außerdem reichlich Sargdeckelkristalle. Dieser Befund ließ auf einen inzwischen hinzugetretenen Blasenkatarrh schließen. Leider war es wegen der Falten- und Taschenbildung im Bereich der vorderen Harnröhrenschleimhaut nicht möglich, einen Blasen Spiegel oder ein Harnleiterscytoskop einzuführen, um ein genaues Bild von dem Zustand der Blase und der Nieren zu gewinnen und zu entscheiden, ob es bereits zur aufsteigenden Infektion der Nieren gekommen ist.

Indigocarmin intravenös erscheint von der Blase aus aufgefangen in 5 bzw. 6 Minuten in genügender Stärke. Bei der Röntgenuntersuchung finden sich normale Nierenverhältnisse, und Harnleiter ohne nachweisbare Steinbildung. Blutharnstoff nüchtern $0,29^{0/100}$, 24 Stunden nach Belastung $0,49^{0/100}$. Durch den Ausfall der Funktionsprüfung der Nieren und der Blutharnstoffuntersuchung wurde festgestellt, daß eine Störung der Nierenfunktion noch nicht vorliegt.

Bei F. war es durch den Unfall zu einem Beckenbruch mit Harnröhrenverletzung gekommen. Da in den Akten zweimal von Beckenbruch und Tripper die Rede war, und F. nach 10 Jahren Rentenanprüche geltend machte, wurde die Frage aufgeworfen, ob die Striktur traumatischen oder gonorrhischen Ursprungs sei. Prof. Hoffmann äußert sich dazu, daß die im Gefolge von Gonorrhoe auftretenden Verengerungen sich so gut wie stets in der vorderen Harnröhre lokalisieren. Striktur der hinteren Harnröhre als Folge von Gonorrhoe werden von vielen Autoren völlig geleugnet, während für die traumatischen durch Unfälle bedingten Strikturen die hintere Harnröhre häufiger in Betracht komme. Lage der Striktur, Verlauf der Entstehung und Fehlen irgendwelcher Residuen lassen die Striktur als Folge des erlittenen Unfalls erscheinen.

Eine andere Frage, die der Steinbildung, wird von Prof. Bunge ob ihres ursächlichen Zusammenhanges mit dem Unfall beantwortet. Wie frühere Beobachtungen ergeben haben, handelte es sich bei F. um Steinbildung bei keimfreiem aseptischem Urin. Bei aseptischem Urin entsteht die Steinbildung auf dem Boden einer Diathese, d. h. Veranlagung zur Nierensteinbildung. Somit war die 1931 beobachtete Nierensteinkolik als Folge des Unfalls abzulehnen. Bei der letzten Untersuchung haben sich die Verhältnisse dahin geändert, als wegen der Inkontinenz Infektion der Harnwege aufgetreten war, wie das allmählich einzutreten pflegt. Hier entsteht die

Steinbildung auf dem Boden des eitrigen Blasen- oder Nierenbeckenkatarrhs. Würde es in der Folgezeit zu erneuter Steinbildung bei F. kommen, zu der er fraglos neigt, so kann für eine spätere Steinbildung ein urfächlicher Zusammenhang nicht abgelehnt werden. Dieses bezieht sich nur auf die mögliche Steinbildung, für die die Infektion der Harnwege nunmehr eine gewisse Prädisposition schafft. Harnwege sind z. Zt. steinfrei.

Die vom damaligen Operateur gewählte Methode des angeblich vollständigen Verschlusses der Harnröhre in Länge von 3 cm (bogenförmige Umgehung des Verschlusses durch Gummikatheter ohne Excision des narbigen Gewebes) kann nicht als eine glückliche angesehen werden, da dadurch ungünstige Verhältnisse für die Nachbehandlung geschaffen wurden. Zweckmäßig wäre die Operation mit Entfernung des gesamten Narbengewebes kombiniert worden, um einen geraden Verlauf zu gewährleisten, den überbrückten Teil der Harnröhre über einen Dauerkatheter zur Ausheilung zu bringen. Prof. Bunge hat in einem ähnlichen Falle auf diese Weise unter langdauerndem Liegenlassen eines Dauerkatheters ein volles Resultat erzielt, ohne daß nach einem Jahr Neigung zur Verengung der auf diese Weise überbrückten Harnröhrenstelle bestand.

Im Anschluß an eine mit festen Bougies vorgenommene Behandlung traten bei F. Inkontinenzerscheinungen auf, die das dauernde Tragen eines Urinals nötig machten. Die nach der am 1. 5. 31 angeblich glatt verlaufenen Bougierung eingetretene Inkontinenz kann nicht anders erklärt werden als durch die Verletzung des Blasen-schließmuskels, die beim komplizierten Verlauf der Harnröhre durchaus verständlich ist.

3. St. F., Bahnarbeiter, 25 Jahre, Unfalltag: 30. 3. 18.

Bei der Beförderung einer Pumpe kippte der Wagen, dabei wurde F. im Hüftgelenk verletzt.

Aufnahmebefund im Alexianer-Krankenhaus Köln: An der rechten Hüfte äußere Hautabschürfungen, rechte Hüft- und Nierengegend gequetscht, Bauchgegend überall auf Druck sehr empfindlich. Linke Bauchhälfte etwas stärker vorgewölbt. Die Blasen-gegend hebt sich nicht stärker vor und ist nicht gedämpft. Mit weichem Katheter wird aus der Blase blutiger Urin entleert. Bei einer nochmaligen Harnabnahme durch Kathe-

ter Blutbeimengung gering; der Katheter als Dauerkatheter gelassen. Weiterer Verlauf fieberfrei, am 4. 4. 18 Weglassen des Katheters, regelmäßiger Katheterismus.

Nach Fieberanstieg am 7. und 10. 4. 18 schmerzhaftes Vorwölben am Damm. Auf Incision Entleerung von Eiter und urinöser Flüssigkeit aus einer großen bis zu den zertrümmerten Schambeinen reichenden Höhle, in der einzelne lose Knochensplitter liegen. Harnröhre zerrissen. Eingang in die Blase schwer auffindbar. Entleerung stark trüber aber nicht blutiger Flüssigkeit aus der Blase. Einlegen eines Dauerkatheters. Die Höhle teils drainiert, teils lose ausgestopft. Anfang Juni Wunde verheilt. Fr. konnte nur sehr wenig Urin halten. Die narbige Stelle der Harnröhre zeigt starke Neigung sich zu verengern. Deshalb Bougierung schließlich bis Charr. 26. 17. 7. 18 Entlassung zur ambulanten Behandlung. Während sich das Fassungsvermögen der Blase bis 300 ccm besserte, Entwicklung von Leistenbrüchen beiderseits, als Unfallsfolgen anerkannt.

Am 19. 12. 18 und 31. 12. 18 Operation beider Leistenbrüche. Während der Behandlung mehrfaches Aufbrechen der Dammnarbe mit Entleerung eitrigiger Flüssigkeit und nachfolgender spontaner Heilung.

18. 3. 19 Entlassung, noch Schmerzen in der Dammgegend mit gelegentlichen Schwellungen in der Narbe. Häufige Entleerung von eitrigiger Flüssigkeit aus der Harnröhre. Blasenentleerung alle 2 Stunden, auch nachts, Schlaf dadurch gestört. Harnröhre für Charr. 24 durchgängig. Fr. wurde lange Zeit nicht bougiert, Harnröhre bleibt gut durchgängig. In der Gegend hinter dem Hodensack besteht eine Ausbuchtung der Harnröhre, in der ein Rest jedesmal zurückbleibt und ausgestrichen werden muß. Rechter Hoden etwas größer als der linke und druckschmerzhaft, desgleichen der rechte Samenstrang. Urin zeitweise blutig und eitrig durch Beimengungen aus der Harnröhre.

Vom 19. 1. bis 1. 3. 21 wegen erneuter Abszeßbildung am Oberschenkel in Behandlung. Während der Behandlung starke Schmerzen bei der Blasenentleerung. Bougierung mit Charr. 19 sehr schmerzhaft. Untersuchung vom Mastdarm aus ergibt harte und schmerzhaftes Schwellung der Vorsteherdrüse. Im zentrifugierten Urin zahlreiche Leucocyten. 5. 3. 21 Entleerung von zahlreichem Eiter durch die Harnröhre. Auch bei Druck auf die Vorsteherdrüse bei Untersuchung vom Mastdarm aus reichliche Eiterentleerung. 26. 4. 21 Vorsteherdrüse von festerer Konsistenz, Abszeß nicht mehr festzustellen. Bei Druck auf die Drüse quillt aus der Harnröhre eine schleimig-eitriges Flüssigkeit. Angeblich kommt der Stuhl plötzlich unter krampfartigen Schmerzen. Im weiteren Verlauf abwechselnd Besserungen und Verschlimmerungen.

16. 6. 21 stärkere Eiterentleerung aus der Harnröhre. Infolge erneuter Besserung vorgeschlagene Operation abgelehnt.

20. 12. 21 Urinentleerung erschwert, erneuter Abgang von Eiter.

1. 5. 22 in der rechten Schenkelbeuge und in der Dammgegend schmerzhaft entzündliche Verdickung. Katheterismus nur in allgemeiner Narkose ausführbar. Bei liegendem Katheter Eröffnung der Schwellung am Damm mit Entleerung von Eiter und Urin. In der eröffneten Höhle liegt die Harnröhre frei. Dauerkatheter, nach dessen Entfernung spontanes Urinieren möglich. Nach Schließung der Höhle Harnröhre narbig verändert mit mehreren Ausbuchtungen.

20. 9. 25 aus der Harnröhre lassen sich nur geringe Mengen von Flüssigkeit austreiben. Die Ausbuchtungen der Harnröhre geschrumpft.

4. 11. 26 ins Johanniter-Krankenhaus aufgenommen. Selbst mit dünnen Bougies kann die unter der Schambeinfuge festgestellte Verengung der Harnröhre nicht überwunden werden. Urethroskopie ergibt derbe unregelmäßig gestaltete Verengung, in deren Bereich eine Harnröhrenlichtung nicht festzustellen ist. Der periphere Teil ist über die Norm ausdehnungsfähig, zeigt wie die nächste Umgebung der Narbe chronische Entzündung. Der Harnstrahl dünn, ohne Kraft, derart, daß beim Entleeren der Blase Fr. sich häufig die Schuhe beschmutzt. 1 ccm Flüssigkeit bleibt in der Harnröhre zurück, dadurch nachts Beschmutzung. Kein Bettnässen.

30. 3. 29 Zunahme der Harnröhrenstriktur. Urin frei von Eiweiß und krankhaften Formbestandteilen.

27. 7. 29 Erweichung der derb infiltrierten Narbe am Damm und ihrer Umgebung. Auf Incision Entleerung von dickem gelben Eiter. Eiterhöhle in Verbindung mit der Harnröhre.

24. 8. 29 Freilegung der Harnröhrenverengung durch äußeren Harnröhrenschnitt. Spaltung der Verengung. Dauerkatheter. Offene Wundbehandlung. Katheterurin trüb eitrig, massenhaft Eiterkörperchen und Diplococcen. 9. 9. 29 Katheter entfernt. Bei starker Blasenfüllung konnte der Urin nicht vollständig zurückgehalten werden. Mehrfach Einnässen. Örtliche Behandlung des Blasenkatarrhs und tägliche Bougierung. Fr. lernt selbst die Bougierung auszuführen. Bei der Entlassung noch leichter Reizzustand der Blase mit häufigem Harndrang.

26. 3. 30 wegen einer Hoden- und Nebenhodenentzündung in ärztlicher Behandlung.

14. 6. 32 strahlige Narbe am Damm in der Mitte eingezogen, rechts von derselben Rötung, auf der linken Seite der Narbe leichte Schwellung mit Schmerzhaftigkeit. Im Harnröhrenbild Schleimhaut am Übergang in den narbigen Teil hochrot, auf der linken Seite hirsekorngroßer Granulationsknopf. 7. 7. 32 Urinentleerung ohne Beschwerden, im Urin Spuren von Eiweiß, Leucocyten in mäßiger Zahl, Coli-Bazillen in größerer, Eitercoccen in geringerer Zahl. Harnröhrenspiegelung ergibt im narbig ver-

änderten Harnröhrenteil links eine divertikelartige Erweiterung von 3 cm Länge. Neben dem verkleinerten Granulationsknopf eine feine Öffnung links zu erkennen, aus der sich auf Druck Eiter entleert. Im Röntgenbild ist die Ausbuchtung der Harnröhre mit Thorotrast gefüllt. Blasenkatarrh nicht wesentlich geändert. Ende Juli 32 erneutes Aufbrechen der Fistel am Damm. Fistel läßt sich mit feinsten Sonde 3 cm tief sondieren, berührt aber nicht ein vorher eingeführtes Metallbougie von Charr. 20. Nach mehrmaligem Schließen bleibt die Fistel bis Ende Januar 33 offen. Da die Fistel trotz Ätzung unverändert Eiter absondert und aus der Fistel erneut Urinentleerung erfolgt, 27. 3. 33 erneut Operation in Avertin-Äthern-Mischnarkose. Operativer Eingriff durch narbige Veränderungen erschwert. Über einem in die Harnröhre eingeführten Metallbougie wird die narbige Harnröhre eröffnet, die urinabsondernde Dammfistel auf der Sonde gespalten bis in die Harnröhre hinein. Nach Ausschneiden des Fistelganges Einführen eines Katheters Charr. 20. Tamponade der Wundhöhle und offene Wundbehandlung.

19. 4. 33 entzündliche Schwellung rechts neben der Gliedwurzel.
21. 4. 33 Eröffnung des Eiterherdes. Im weiteren Verlauf entleert sich aus dieser Einschnittöffnung außer Eiter zeitweise Urin, ebenso tropft aus der noch nicht geheilten Dammfistel zeitweise etwas Urin ab, besonders bei Blasen- und Stuhlentleerung. Beide Fisteln schlossen sich vorübergehend, um erneut unter mäßiger Eiterabsonderung und tropfenweiser Urinentleerung wieder aufzubrechen.

Seit 20. 6. 33 Fisteln vollständig geschlossen bei täglichem Selbstbougieren. Das Fassungsvermögen der Blase zunächst 50, bei der Entlassung 100 ccm. Nach der Blasenentleerung müssen geringe in der Harnröhre zurückbleibende Urinmengen, etwa 10 bis 15 Tropfen, ausgestrichen werden, um Urinträufeln zu vermeiden. Im Urin Spuren von Eiweiß, rote und weiße Blutkörperchen in geringer Zahl, ebenso Blasen- und Harnröhrendeckzellen und vereinzelte Diplococcen. Während der ambulanten Behandlung gelegentlich Entleerung von Blut und Eiter aus der Harnröhre.

10. 5. 35 erneute Aufnahme ins Johanniter-Krankenhaus wegen Klagen über dauernden Harndrang und unfreiwilligen Abgang von Urin mit Nachträufeln, wenn er die Blase nicht sofort entleeren könne. Blutdruck R.R. 136/62 mm Hg. Blasenpiegelung ergibt starke Rötung des Blaseneingangs, im übrigen chronische Cystitis. Bei der Urethroskopie Harnröhrenspalt an der Verengerungsstelle sichelförmig, Granulationsknopf nicht mehr nachweisbar. Deutliche Schwäche des Blasenschließmuskels. Starker Harnröhrenkatarrh durch Rivanolspülung erheblich gebessert.

18. bis 20. 6. 36 bei erneuter Untersuchung im Johanniter-Kranken-

haus keine Schwäche des Schließmuskels mehr, Fr. mußte sogar längere Zeit pressen bevor die Urinentleerung in Gang kam. Harnstrahl schlaff und gedreht. Urin fauer, mäßige Mengen von Eiweiß, in mittleren Mengen Leucocyten und Blafendeckzellen, einige Erythrocyten und reicher Bakteriengehalt (Stäbchen und Coccen). Unterfuchung der Prostata ergibt: Mitte weich, linker vergrößerter Anteil ist derber als rechts und lebhaft druckschmerzhaft. Bei Massage der Prostata läßt sich kein Sekret aus der Harnröhre auspressen. Bei der Harnröhrenspiegelung ist in 13 cm Tiefe dicht vor der spaltförmigen Verengerung links wieder ein kleiner Granulationsknopf zu erkennen. Bei der Blafenspiegelung mit Cystoskop Charr. 20 zeigt sich die Blafenschleimhaut stark gerötet und gewulstet. In der so veränderten Schleimhaut sind die Harnleiter kaum erkennbar. Gefäßzeichnung verwischt. Auscheidung von Indigocarmin erfolgt rechts nach 2¹/₂, links nach 5 Minuten in einem dünnen an Intensität bald zunehmenden Blauftrahl.

Der Beckenbruch mit Verletzung der Harnröhre hat bei Fr. zu schweren Folgeerscheinungen geführt: Zunehmende Verengerung der Harnröhre mit schwerer Cystitis, eitriger Infektion der Prostata, mehrfacher Abzeßbildung mit Urinfistelbildung, Divertikelbildung in der Harnröhre, Entwicklung von Leistenbrüchen, Hoden- und Nebenhodenentzündungen und zeitweilig Schwäche des Blafenschließmuskels. Durch mehrere Operationen wurde schließlich ein erträglicher Zustand geschaffen, Erwerbsbeschränkung 50%.

4. F. Ha., Schlepper, 17 Jahre, Unfallstag: 27. 6. 31.

Beim Herablassen der Schremmaschine rutschte diese ab, Ha. wurde hierbei verschüttet und mußte unter derselben herausgezogen werden. Sofortige Überführung ins Josef-Krankenhaus in Mörs. Aufnahmebefund: Rechtes Bein auswärts rotiert. Aktive und passive Bewegung des rechten Beins unmöglich, große Druckempfindlichkeit am Schenkelhals. Aus der Harnröhre entleerte sich eine Menge Blut. Wasserlassen unmöglich, ebento katheterisieren. Röntgenbild: Bruch der rechten Hüftgelenkpfanne, des rechten oberen und unteren Schambeinaastes und der Schamfuge. Operation in Steinschnittlage. Freilegung der Harnröhre, Einführung eines Katheters in das obere und untere Ende der stark zerrissenen Harnröhre. Tamponade. In der Nacht starker Blutverlust durch ständiges Nachsickern. Durch Claudentamponade steht die Blutung. Allmähliche Heilung des Beckenbruchs unter Becken-Oberschenkelstrecke rechts und der Wunde, wobei jedoch Urinfistel bleibt und der Urin nicht gehalten werden kann (Zerreißung des Sphinkters).

12. 11. 31 beim Wasserlassen Klagen über Stauungs- und Verhaltungs-

schmerz bei völliger Inkontinenz (5 Minuten kann der Urin gehalten werden.) Nach mehrfachen, in Narkose vorgenommenen fruchtlosen Versuchen des Katheterismus und mißlungenem Versuch durch die Damnfistel in die Blase zu gelangen, wird nach hohem Blafenschnitt der retrograde Katheterismus vorgenommen. Da auch dieser mißlang, Einführen eines dicken Katheters durch die Harnröhre bis in Blafennähe, dann Durchstoßung der Katheterspitze durch die innere Harnröhrenmündung bis in die Blase und Durchziehen eines Dauerkatheters. In der Wundgegend blieb eine Urinfistel, die aber spontan hielt. Katheterwechsel gelingt an einem durch den hohen Blafenschnitt gehenden Seidenfaden bei täglicher Rivanoldurchspülung. Nach mehrfacher teilweiser recht schwieriger Auswechslung wird der undurchgängige Dauerkatheter vom Patienten herausgepreßt und nicht mehr ersetzt. Eine Nachbehandlung mit Bougierung fand nicht statt.

Seit 12. 12. 31 allmähliches Ansteigen der Temperatur bis 41,5°, mit zwei- bis dreimal täglich schweren linksseitigen Nierenkoliken infolge septischer Blafen- und Nierenentzündung, die nach erfolgloser Verwendung aller Harndesinfizienten erst durch Immunisierung auf Temperatur von 37,2° am 12. 1. 32 abfiel. Während der Nierenkoliken war die linke Nierendämpfung vergrößert und eine Schwellung (Hydronephrose) tastbar. Urin alkalisch, enthielt Eiweiß, Leucocyten, einzelne Erythrocyten, massenhaft Bakterien (Coli-Bazillen und Streptococcen), mehrere Nierenepithelien und Trippelphosphate. Nach 4 Tagen geringerer Temperaturhöhe bis 37,5° erfolgte nochmals Fieberanstieg bis 39,5° am 19. 1. 32. Durch nochmalige Immunisierung verschwinden die Nierenerkrankungen, zugleich Entfieberung. Bei seiner Entlassung war die septische Nieren- und Nierenbeckenentzündung mit zeitweise linksseitiger Hydronephrose behoben. Durch die vollständige Blaseninkontinenz ist er gezwungen, ein Urinal zu tragen.

Bei der Aufnahme ins Johanniter-Krankenhaus am 8. 2. 32 fand Prof. Bunge eine etwa 10 cm vom Orificium externum beginnende und bis dicht zur Blase hinziehende starke Striktur der Harnröhre, deren Überwindung durch einen Ureterkatheter nur zweimal durch glücklichen Zufall gelang. Bei einer Scheinkontinenz von 10 Minuten wird der Urin in einem streichholzdünnen Strahl entleert. Da keine Durchgängigkeit der Harnröhre selbst für filiforme Bougies mehr vorhanden war und im Urin sich massenhaft Leucocyten und zahlreiche Diplococcen vorfanden, wurde am 20. 2. 32 erneute Operation vorgenommen.

In Steinschnittlage wurde die Verengerung nach Durchtrennung des Narbengewebes breit eröffnet und unter Leitung des Ureterkatheters blasenwärts verfolgt. Da man bei weiterer Fortsetzung der Operation vom Damm aus in unübersichtlichem Narbengewebe mit unerwünschten

Nebenverletzungen rechnen mußte, Fortführung der Operation von der Blase aus. Von der Blase aus wurden feste Bougies von zunehmender Stärke in den Anfang der Harnröhre eingeführt, und nach Durchtrennung des noch übriggebliebenen Narbengewebes wurde dieser Teil der Harnröhre mit dem vom Damm aus freigelegten in Verbindung gebracht; durch die Harnröhre ein dicker Dauerkatheter von Charr. 25 in die Blase eingeführt. Schluß der Blasenwunde um einen zweiten Katheter. Schluß der Dammwunde bis auf einen eingeführten Tampon.

Bei der Operation konnte nichts mehr von einer neuen Harnröhre, die durch den Lissosphinkter gebildet sein und die Kontinenz erklären sollte, wie der frühere Operateur angenommen hatte, vorgefunden werden. Eine Durchtrennung des sehr derben, ringförmigen Narbengewebes um die innere Harnröhrenmündung und der in daselbe eingeschlossenen Reste des durchquetschten willkürlichen Schließmuskels wurde nicht mit dem Messer vorgenommen, sondern nur eine Dehnung des Narbengewebes im hinteren Teil der Harnröhre bewirkt. Fassungsvermögen bis 25 ccm, dann Urindrang alle 15 Minuten. Deshalb Urinal. Urin leicht getrübt, Eiweiß in Spuren, wenig Leucocyten und Coccen. Eine feine Fistel in der Dammnarbe schloß sich nach wenigen Tagen. Nach endgültiger Entfernung des Katheters wurde täglich bis zur Stärke Charr. 23 bougiert. Ha. führt die Bougierung selbst sehr geschickt aus. Nach Urofektaneinspritzung wurde im Röntgenbild zwar eine Erweiterung des Anfangsteiles des linken Harnleiters und des linken Nierenbeckens festgestellt, jedoch keine Steinbildung. Schmerzen von seiten der Nieren blieben während der Behandlung aus.

5. 9. 32 die Blase enthält 100 ccm klaren Urin. Es scheint sich doch eine gewisse Schlußfähigkeit der Blase vorzubereiten.

24. 3. 33. Ein inzwischen gebildeter Blasenstein wurde operativ entfernt. Wegen Blasenkatarrh fortlaufend Blasenpülung. Im Urin auch jetzt noch reichlich Mischbakterien, wenig Leucocyten und Erythrocyten, leichte Eiweißtrübung und kohlenaurer Kalk.

Vom 23. 5. bis 6. 7. 33 stationäre Behandlung wegen wiederholt auftretender Schmerzen in beiden Nierengegenden, am stärksten links. Bei Nachmessungen wurden Temperatursteigerungen bis 38° bestätigt. Ein Stein ist weder in der Niere noch in Harnleiter und Blase nachzuweisen. Auf Cylotropin und Wildunger Wasser gingen die Erscheinungen etwas zurück, verschwanden aber nicht.

11. 7. 33 wird in auswärtigem Krankenhaus ein doppelseitiger Nierenkolikanfall mit Übelkeit und starker Pulsbeschleunigung beobachtet. Seit dieser Zeit treten die Anfälle gehäuft auf, so daß Krankenhausbehandlung erforderlich wird.

8. 8. 33 bei der Cystoskopie der Blase im Johanniterkrankenhaus ist die rechte Hälfte des lig. interureter. intensiv gerötet und stark geschwollen. Die rechte Harnleitermündung ist deutlich zu sehen, ödematös und verquollen. Der Harnleiterkatheter läßt sich in die gequollene Harnleitermündung soeben einführen, knickt jedoch bei wiederholten Versuchen, ihn vorwärts zu schieben, ab. Während der Untersuchung kommt harnröhrenwärts von der Harnleitermündung am Übergang ein Granulationsknopf ins Gesichtsfeld, der am Rande mit fingerförmigen Fibrinmassen bedeckt ist. Urin jetzt alkalisch, im Sediment Carbonate und Urate.

31. 10. 33. Nachlassen der Kolikschmerzen. Einführung eines Cystoskops gelingt ohne jede Schwierigkeit, Granulationsknopf verschwunden. Indigocarmin wird nach 3 Minuten beiderseits in großen blauen Wolken ausgeschieden.

Nach der Krankenhausentlassung noch öfters Nierenkoliken mit hohem Fieber.

5. 3. 34. Ha. macht gegen früher einen schlechteren Allgemeindruck, sieht blaß aus, ist überdies reizbar. Der Blasenurinbefund unverändert; im Ureterurin wenige Leucocyten, einige Erythrocyten, keine Zylinder, Coli-Bazillen in mäßiger, Coccen in größerer Zahl. Harnstoffkonzentration der Nierenurine nach Harnstoffbelastung rechts $31,5^{0/100}$, links $16,5^{0/100}$. Blutharnstoff $0,1^{0/100}$, 24 Stunden nach Harnstoffbelastung $0,18^{0/100}$. Im Pyelogramm konnte der Übergang des Urins aus dem erweiterten, leicht abgerundeten Nierenbecken in den Harnleiter nicht festgestellt werden.

Durch die Infektion der Nieren hat auch die Funktion der linken Niere gelitten. Die letzten Röntgenbilder machen es wahrscheinlich, daß die Hinderung des Urinabflusses am Übergang des Nierenbeckens in den Harnleiter erfolgt. Bei der Beobachtung der Anfälle stellt sich folgender bemerkenswerte Verlauf heraus: Sobald die im Mastdarm gemessene regelmäßig unter 38° bleibende Temperatur über 38° stieg, stellten sich ziehende Schmerzen in der linken Nierengegend mit begleitender Unruhe ein, schließlich typische Kolikanfälle von wechselnder Stärke, gelegentlich von dreistündiger Dauer. Dieses Verhalten wurde bei sämtlichen Anfällen festgestellt.

Vom 10. 7. bis 18. 8. 34 zwecks Behandlung und Beobachtung im Johanniter-Krankenhaus. Täglich traten Kolikanfälle auf, manchmal drei am Tage, regelmäßig eingeleitet durch leichte Temperatursteigerung, die während des Anfalls bis 39° erreichte. Nach Morphium-Atropin und Ace-dicon-Einspritzung verliefen die Anfälle milder, wenn die Einspritzung bei den ersten Anzeichen des Anfalls gemacht wurde. Wesentliche Urinänderung während der Behandlung war nicht zu verzeichnen. Blasen-spiegelung: Blase entzündlich verändert, Harnleitermündungen überhaupt nicht

zu erkennen, Harnleiterkatheterismus unmöglich. Am Tage der Blafenspiegelung mehrere Kolikanfälle. Ein am 12. 7. 34 gemachtes Röntgenbild läßt den Eindruck aufkommen, als ob der Harnleiter eine gewisse Verlagerung zeigte, im Sinne einer Wringdrehung in Höhe des 2. Lendenwirbels. Aus dem steril entnommenen Blafenurin werden Enterococcen und Coli-Bakterien gezüchtet und eine Autovaccine-Kur eingeleitet. Entlassung in Behandlung des Revierarztes.

Nach einem ärztlichen Bericht wurde nur einmal eine vorübergehende Einwirkung auf Stärke und Zahl der Anfälle erkennbar, später mußten etwa alle 3 bis 4 Tage bei Verordnung von Acedicon und Bellafolin 16 Ampullen verschrieben werden.

12. 12. 34. Bei der Aufnahme machte Ha. gegen früher einen merkbar veränderten günstigen Allgemeineindruck. Blafenspiegel leicht einzuführen. Blafenschleimhaut jetzt fast normale Beschaffenheit. Harnleitermündungen ohne Entzündungserfcheinungen; Harnleiterkatheter lassen sich leicht bis ins Nierenbecken vorschieben. Im Sediment beider getrennt aufgefangener Urine finden sich nur die beim Harnleiterkatheterismus stets zu findenden nicht krankhaften Beimengungen von spärlichen Leucocyten, Erythrocyten und Harnleiterdeckzellen. Selbst bei eingehendster mikroskopischer Untersuchung werden Eitererreger (Bakterien und Coccen) nicht gefunden, auch keine Zylinder und säurefesten Stäbchen. Intravenös injiziertes Papavydrin kupiert innerhalb 10 Minuten den Anfall. Verabreichung von Fachinger Wasser ohne Einfluß auf Zahl und Art der Anfälle.

Aufhören der Anfälle nach Aussagen des Patienten angeblich nach Trinkkuren von Wernarzer Wasser.

27. 3. 35 Eiweißreaktion im Urin schwach positiv, Reaktion fauer. Im gefärbten Schleuderpräparat nur spärliche Leucocyten, Bazillen und Coccen. Aufnahme nach Uroselektaneinspritzung zeigt normale Nierenverhältnisse rechts. Linkes Nierenbecken ohne Erweiterung. Übergang des Nierenbeckens zum Harnleiter gut gefüllt. Der Harnleiter nur bis zur Höhe des 3. Lendenwirbels erkennbar. Drehung des Harnleiters nicht mehr nachweisbar.

Vom 4. bis 8. 8. 36 zwecks Untersuchung im Johanniter-Krankenhaus.

Ha. hat inzwischen Arbeit über Tag aufgenommen auch größere Radtouren unternehmen können.

Das feelische Verhalten hat sich wesentlich gebessert. Er ist jetzt ganz ruhig und ausgeglichen.

Blutdruck R.R. 125/75 mm Hg. Harnröhre für Charr. 25 durchgängig. Blafenspiegelung: Am Blafenboden Schleimhaut etwas gequollen.

Harnleitermündungen nach dem Blafeneingang etwas verzogen. Die Katheter können ohne Hindernis bis ins Nierenbecken vorgeschoben werden. Kolikanfall klingt auf Dilaudid-Atropin langsam ab. Im Schleuderpräparat beider Nierenurine Leucocyten in geringer, Coccen in mäßiger Zahl. Im Röntgenbild linker Nierenschatten etwas verkleinert, linkes Nierenbecken etwas harnleiterwärts ausgezogen. Im Verlauf des Ureters Urinfpindel nicht erkennbar. Harnstoffgehalt nach Harnstoffbelastung beiderseits $13^{0/00}$. Blutharnstoff $0,20^{0/00}$.

Die erneut vorgenommene Funktionsprüfung der Nieren weist darauf hin, daß beiderseits der Infektionsprozeß auf die Nierensubstanz übergriffen hat, während die Gesamtfunktion noch nicht gelitten hat wie der günstige Blutharnstoff zeigt. Mit Rücksicht auf den spärlichen Befund an Coccen erneute Autovaccine-Kur.

Bei Nachuntersuchung im auswärtigen Krankenhaus Januar 1937: Nierenurin bakterienfrei. Klagen über gelegentliche Nierenschmerzen. Fähig zu Arbeit über Tage.

Der Unfall vom 27. 6. 31 hatte zu schwerem Beckenbruch mit Harnröhrenzerreißung geführt. Nach Operation der abgerissenen und zerfetzten Harnröhre in auswärtigem Krankenhaus wird nach Stauungs- und Verhaltungsschmerz bei völliger Inkontinenz und fruchtlosem Versuch des Katheterismus eine nochmalige Operation notwendig. Nach mehrfacher, teilweise recht schwieriger Auswechslung des Dauerkatheters wurde am 29. 12. 31 der Katheter entfernt und nicht mehr ersetzt. Nachbehandlung mit Bougierung fand nicht statt. Die angenommene Kontinenz war eine Scheinkontinenz, bedingt dadurch, daß die Blase erst einen bestimmten Füllungsgrad erreichen mußte bis infolge des gesteigerten Innendrucks der Blase die hindernde Harnröhrenverengung überwunden wurde. Dabei trat der Schließmuskel nicht in Tätigkeit. Sofortiger Urinabfluß mit häufigem Einnässen war die Folge. Die Annahme des ersten Operateurs, daß er durch Verlagerung der Harnröhre durch den Lissosphinkter Kontinenz erreicht habe, erwies sich bei der von Prof. B u n g e vorgenommenen Operation als irrig. Es fand sich nur die eine reguläre Harnröhrenmündung in der Blase, im übrigen eine hochgradige längere Striktur. Der Übergang der Harnröhre in die Blase einschließlic der Gegend des Blafenschließmuskels war in ein derbes Narbengewebe umgewandelt. Selbst wenn noch der Schließmuskel vorhanden war, so war in dem derben Bindegewebe eine Funktion des-

selben ganz ausgeschlossen. Im Gefolge der Operation stellte sich eine teilweise Kontinenz bis 250 ccm wieder her.

Bereits 6 Monate nach der Verletzung Auftreten von Nierenkoliken, die nach vorübergehendem Aufhören erneut auftreten unter mäßiger Erweiterung des linken Nierenbeckens bei Abflußbehinderung. Die Annahme, daß entzündete Schleimhautschwellung infolge der Infektion Ursache der Koliken und des behinderten Urinabflusses ist, wird dadurch bestätigt, daß die Koliken aufhören, nachdem der Urin keimfrei geworden war.

Ein inzwischen gebildeter Blasenstein wurde operativ entfernt. Gewisse Kontinenz wurde erreicht. Ha. muß weiter ein Urinal tragen. Er ist fähig zu Arbeit über Tage.

Um einer Sucht nach Narkotici entgegen zu arbeiten, wird Weitergewährung narkotischer Mittel streng untersagt.

5. J. H., Kohlenhauer, 28 Jahre, Unfalltag: 18. 1. 23.

Beim Verletzen eines Stempels vom Gestein verschüttet. Bei der Einlieferung ins Knappschaftskrankenhaus in Sulzbach konnten die Beine selbsttätig nicht gehoben werden. Bei der Abtastung der Schambeinfuge und des linken horizontalen Astes hatte man Crepitationsgefühl. Die mittlere und rechte Unterbauchregion war durch einen größeren Bluterguß vorgewölbt und druckschmerzhaft. Der in die Harnröhre eingeführte Katheter gelangte nicht in die Blase sondern verlor sich im präviskalen Fettgewebe. Durch den Katheter entleerte sich Blut: Diagnose: Ausgedehnte Splitterung des linken horizontalen und Fraktur des aufsteigenden Schambeinastes, Auseinanderweichen der Symphyse und Harnröhrenzerreißung.

Wegen Verdacht auf eine Blasenverletzung und zur Vermeidung von Urininfiltration, oberhalb der Symphyse durch Längsschnitt sofort die Blase freigelegt. Im cavum Retzii ausgedehnter Bluterguß; Blutung stammt von einer Gefäßzerreißung in der Gegend der Splitterfraktur. Feste Tamponade unter dem horizontalen Schambeinast. Freilegung der Blasenwand und Eröffnung der Blase. Urin nicht bluthaltig. Erneute Sondierung von der Blase aus ergab, daß die Harnröhre am Blasenhals abgerissen war. Eine Naht der Harnröhre von der Bauchwunde her war nicht möglich. Einführen eines Drains in die Blase, zwei Nähte in die Bauchdecke.

Da am Damm beginnende Urininfiltration auftrat, am 25. 1. 23 parabelförmiger Schnitt unterhalb des Scrotums. Der zentrale Teil der Harnröhre in dem zertrümmerten mit Blutcoagulis durchsetzten und in-

filtrierten Fettgewebe nur nach großer Mühe aufgefunden. Einführen eines Verweilkatheters in die Blase, hinausgeleitet durch die vordere Harnröhre. Harnröhrenenden vereinigt, Wunde am Damm nach Einführung eines Drains und Gazestreifens durch einige Situationsnähte geschlossen. Urininfiltration am Damm zeigte anfangs Neigung zum Fortschreiten, bildete sich nur langsam zurück. 14 Tage lang abends Temperaturen bis 38,5°, in den nächsten 14 Tagen subfebril. Zur Verhütung einer aufsteigenden Blasenentzündung reichlich Harnantiseptica und täglich Blasen-spülungen.

Trotzdem Auftreten einer nekrotisierenden erheblichen Cystitis. Ende Mai Blasenwunde völlig geschlossen. Zur Vermeidung von Strikturbildung Bougierung, wegen Splitterung der Symphyse schwierig und schmerzhaft. Im Laufe der Behandlung Abstoßung mehrerer Splitter unter die Bauchdecke, sowie einiger kleinerer Splitter in die Harnröhre. Erstere mußten durch Incision in der rechten Leistengegend und vom Scrotum aus operativ entfernt werden. Infolge der Schwere der Verletzungsfolgen, des langdauernden sehr schmerzhaften Krankenlagers, der Hautmazerationen, des dauernden Uringeruches und der hierdurch bedingten Appetitlosigkeit litt die körperliche und seelische Spannkraft sehr, es stellten sich Depressionszustände ein, Zwangswainen usw. Anfang Juni konnte H. aufstehen. Am Damm blieb eine Fistel bestehen, die konservativ nicht zum Verschuß zu bringen war. Nach Weglassen des Katheters floß anfangs der größte Teil des Urins aus der Fistel, später kamen jeweils beim Wasserlassen nur noch einige Tropfen. Bei der Entlassung am 20. 8. 23 Allgemeinzustand gebessert, auch eine Hebung der psychischen Abgeschlagenheit.

Die Röntgenaufnahme zeigte eine Senkung der linken Beckenhälfte um 1½ Querfinger. Der linke horizontale Schambeinaast an der Verbindung mit dem Darmbein abgerissen und 1 Querfinger nach unten verschoben. In dieser deformen Stellung verheilt, atrophisch. Am Übergang vom horizontalen in den aufsteigenden Schambeinaast bimssteinartiger Callus, in dem einige kleine, freie Sequester sichtbar sind. Am Übergang vom Sitzbein in den aufsteigenden Schambeinaast Fraktur knöchern verheilt. Infolge Verschiebung der beiden Schambeinäste ist die linke Beckenhälfte verschmälert, erscheint komprimiert. Beckenknochen im ganzen etwas kalkarm. Gang stärker hinkend und schonend. Erhöhte Muskel-erregbarkeit. Ausgesprochene vasomotorische Übererregbarkeit. Im linken Schenkel der Dammnarbe hirsekorngroße Fistel, beim Wasserlassen regelmäßig Urin sezernierend. Urinstrahl mittelkräftig, etwas gegabelt, in Ruhe etwa zweistündliche Urinentleerung, beim Gehen alle 10 Minuten. Urinentleerung nicht sofort, sondern jeweils erst nach wenigen Minuten. Rechte Gefäßmuskulatur und rechte Beinmuskulatur deutlich schlaffer als links.

Seit 8. 6. 24 in Behandlung eines Nervenarztes in Saarbrücken. Die mißtrauische, verdrossene, überempfindliche, auf Rentenerhaltung stark bedachte Stimmung läßt sich nur mühsam in Ruhe halten. Beim An- und Ausziehen übertrieben unbeholfen. Klagen über Mangel an Erektion und Geschlechtsreiz; bleibt jahrelang in dieser Behandlung.

31. 7. 24. Bei Bougierung der Harnröhre mit Metallbougie bis Charr. 12 fühlt man deutlich einen noch nicht ganz gelösten Sequester. Höllensteinätzung der Fistel, Blasenpülung zur Besserung der starken Cystitis.

14. 10. 24 Fistel geschlossen, Blasenkatarrh gebessert.

18. 2. 25 entzündliche Prozesse noch nicht zum Stillstand gekommen. Abstoßung zweier Knochensplitter. Fistel zeitweise geschlossen, sonst drücken sich nur einige Tropfen Urin durch.

20. 9. 25 Harnverhaltung. Nach Anwendung von Wärme kann H. nach einer Stunde Wasser lassen. Am Damm oberhalb der Fistel eine leichte, schmerzhaftes Schwellung von Daumenkuppengröße. Urin sehr trüb, reichlich Leucocyten und Coli-Bazillen, kein Blut. Im Röntgenbild an der Symphyse mehrere noch nicht vollständig gelöste Sequester, die die geklagten Beschwerden erklären: Brennen in der Harnröhre beim Wasserlassen, bei Wirksamkeit der Bauchpresse Schmerzen am Damm.

Vom 14. 7. 26 bis zum 26. 3. 27 im Krankenhaus zu Sulzbach. Alte Narbe oberhalb des Schambeinastes entzündlich gerötet, etwas teigig infiltriert, keine Fluktuation. Bis zur Incisionsreife am 14. 7. 26 feuchte Verbände. Bei Sondierung an der Incisionsstelle schon in 1 cm Tiefe rauher Knochen. 24. 7. 26 bei Harndrang tropfenweise Urinentleerung aus der Einschnittöffnung. Zeitweise Dauerkatheter erforderlich, um die Urinfistel im Unterbau zur Abheilung zu bringen.

9. 8. 26 Harnröhre durch bogenförmige Schnittführung am Damm freigelegt und eröffnet, um dem Hindernis, das sich beim Bougieren vor dem Blasenaustritt entgegenstellte, beizukommen. Ein Sequester nicht auffindbar. Die alten Narbenverhältnisse gestalteten den Eingriff besonders schwierig. Einlegung eines Dauerkatheters. Mittels Metallkatheters Eröffnung eines kleinen Abzesses in der Nähe der Symphyse. 28. 8. Beim Katheterwechsel stieß sich ein kleiner Knochensplitter ab. Beim Bougieren mußte man auf Größe Charr. 7 zurückgreifen, um ein vor dem Blasenaustritt liegendes Hindernis zurückzuschieben. Bei Beginn von Charr. 11 ein Eindringen in die Blase unmöglich. Cystoskopie gelang niemals. Die Art des Fremdkörpers war klar, als sich im Dezember ein kleiner Blasenstein durch die Harnröhre entleerte, der nach Untersuchung des Medizinal-Untersuchungsamtes größtenteils aus kohlenfaurem Kalk, aus etwas phosphorsaurem Kalk und Magnesia und geringen Mengen Uraten bestand. Ein gleichartiger, gut erbsengroßer Stein bildete sich an der

Fistelfelle der rechten Unterbauchnarbe unter der Haut, die dadurch etwas vorgerückt wurde. Nach Aufbruch der Narbe spontane Entleerung eines Steins. Neigung zur Steinbildung durch Koständerung nicht beeinflußt. Durch den erwähnten Blasenstein kam es manchmal zur vollständigen Urinverhaltung, wodurch die Urinfistel am Unterbauch und am Damm zum Aufbruch neigte. Auch am rechten Schenkel bestand diese Neigung; wenn ein Verweilkatheter eingelegt wurde, auch Urinträufeln.

10. 3. 28 Besserung im Allgemeinbefinden. Früher vorgebrachte Klagen, er könne keine Kinder mehr erzeugen, werden durch Vaterfchaft ad absurdum geführt. Urin trüb, im Sediment Leucocyten und Coli-Bazillen.

11. 3. 29. Urin schokoladenfarbig, mikroskopisch in großer Menge Leucocyten und Erythrocyten. Im Röntgenbild ein kompakter, nicht ganz walnußgroßer, rundlicher Schatten, der als Blasenstein gedeutet wurde.

26. 3. 29 in Scopolamin-Morphin-Äther-Narkose Eröffnung der Blase in altem Medianchnitt. Entfernung zahlreicher Steinbröckel und eines fast kirschgroßen, abgerundeten Verschußsteines am Blasenausgang; Schluß der Blase durch zwei Schichtnähte unter Einführung eines Drains und eines Dauerkatheters. Blase selbst für 8 Tage drainiert. Zur Unterstützung des Operationserfolges d. h. zur Erzielung eines sauren Harnes, der der erneuten Steinbildung entgegenwirken sollte, wurde eine fleischreiche Kost und Phosphorsäure-Limonade verabreicht.

29. 1. 30 Entleerung des trüben Urins in dünnem gedrehtem Strahl; Harnträufeln. Erneut Steinbildung.

15. 5. 30 Krankenhausaufnahme. Behinderung der Harnentleerung durch einen in die Harnröhre vorgedrungenen Stein. Stein wurde in die Blase zurückgedrängt, Behandlung des bestehenden Blasenkatarrhs.

10. 9. 30 beim Bougieren gelang die Überwindung des Hindernisses am Blaseneingang mit Bougienummer 12. Urin getrübt, sauer, Spuren von Eiweiß, Leucocyten und Coli-Bazillen. Linker Hoden etwa bis auf Hühnereigröße angeschwollen und heiß. Nebenhoden nicht abzugrenzen. Samenstrang etwas verdickt. Die Behandlung bestand in Hochlagerung, Ichthyolverbänden und harndesinfizierenden Mitteln. Meist gelang es, die Verlegung des Blaseneingangs dadurch frei zu bekommen, daß beim Bougieren der Stein zerbröckelte oder, wenn das nicht möglich war, den Stein in die Blase zurückzudrängen.

21. 5. 31 Harnverhaltung. Bei dem sehr schmerzhaften Bougieren mit Charr. 12 gelang es, das vorliegende Konkrement zu zertrümmern. Kleinste Bruchstücke wurden danach mit dem Urinstrahl ausgewewmt. Mikroskopisch bestand sie aus phosphorsaurem Kalk. Gehäufte Urindrang gebessert. Der noch gedrehte Harnstrahl erfolgt erst nach

einigem Zuwarten, die Einzelportionen waren größer geworden, nach der Miktion Nachträufeln.

29. 4. 32. Harn kann erst nach langem Pressen im Sitzbad und unter Blutabgang wiederholt in unterbrochenem, dünnem Strahl gelassen werden. Im Urin neben massenhaft Leucocyten, Trippelphosphate.

7. 7. 32 Urinverhaltung. Bei der Sondierung der Harnröhre Entleerung von reichlich Blut und kleinen Steinen. An der rechten Oberschenkelinnenseite eine handflächengroße, entzündlich gerötete und fluktuierende Anschwellung. Außer reichlich Eiter entleert sich auch etwas Urin. Eine am 18. 7. 32 vorgenommene Röntgenkontrastaufnahme zeigt eine typische Schrumpfbulae. Wegen Verschlechterung wurde am 5. 9. 32 durch einen Mittelschnitt in der alten Narbe die Blase freigelegt und ein an der rechten vorderen Blasenwand sitzender, walnußgroßer Stein entfernt, der sich um ein durch die Blasenwand gedrungenes Knochenstück gebildet hatte. Blase von diesem Knochenteil abgelöst und nach Anlegung eines Drains vernäht; ebenso der vor der Blase liegende Raum drainiert und durch Muskelhautnähte geschlossen. Dauer- und Blasenkatheter mußten sehr häufig gewechselt werden. Die Operationswunde heilte nicht, so daß sich eine klaffende Wunde bildete, die nur langsam zuheilt. Die inzwischen geschlossene Oberschenkelfistel mußte wegen entzündlicher Schwellung nochmals gespalten werden. Aus der Operationswunde und aus dem rechten Oberschenkel Urinträufeln. Harnröhre für Bougie Charr. 9 durchgängig.

17. 1. 33 in der Blasegegend intensiver Steinschatten. Urinbefund unverändert. Die bakteriologische Untersuchung ergab reichlich Diplo- und Staphylococcen und Coli-Bazillen. Therapeutisch wurde die Blase mit Uro- und Amphotropin behandelt. Daraufhin nahmen die Diplococcen und Coli-Bazillen wesentlich an Zahl ab. Vom 19. 2. bis zum 22. 2. 33 fieberhafte Bronchitis.

22. 5. 33 Fistel in der alten Abseßoperationswunde sezerniert mäßig dünnflüssigen Eiter. Die Oberschenkelfistel mit hypertrophischen Granulationen sezerniert zeitweise auch urinös. In der Umgebung der Fistel kleine Furunkel; später auch Furunkel an der rechten Hand und am linken Oberschenkel.

19. 5. 34 wiederum Steinbildung und zwar im hintersten Teil der Harnröhre, dadurch Harnpassage erschwert. Durch Bougierung gelang es, den Stein teilweise zu zertrümmern. Eine Entfernung des Steines gelang auch nicht unter Zuziehung eines Facharztes.

2. 11. 34. Blase kann spontan entleert werden und zwar in Pausen von $1\frac{1}{2}$ bis $3\frac{1}{4}$ Stunde. Eine Störung der Nierenfunktion besteht nicht (Reststickstoff normal). Nach Bougierung entleeren sich Steinbröckel, die chemisch aus harnsaurem Ammoniak bestanden.

30. 7. 35 fast vollständige Harnsperre vorhanden. Tropfenweise Abgang von Urin unter sehr großen Schmerzen. Mit Metallbougie gelang es im Verlauf von einigen Tagen einen Weg durch den ziemlich bröckeligen Stein zu bahnen und die Öffnung langsam zu erweitern.

22. 10. 35 Aufnahme ins Johanniter-Krankenhaus. Trotz dauernden starken Harndrangs konnte H. unter Stöhnen, oft längere Zeit im Bette knieend, nur tropfenweise unter starkem Pressen und brennenden Schmerzen Urin lassen. Blutdruck R.R. 135/90 mm Hg. Oberhalb und unterhalb der alten Fistel zwei weitere Fisteln in entzündlich veränderten Weichteilen. Urin sehr trüb, 3^{0/00} Eiweiß, alkalisch mit starken Schleimbeimengungen. 23. 10. 35 abends heftige Schmerzen in der rechten Oberbauchgegend mit Bauchdeckenspannung. Rechte Niere vergrößert. Schmerzen schwinden nach Einführung eines schmerzstillenden Zäpfchens. Einführen eines Tieman-Katheters Nr. 16 in die Blase leicht, bleibt als Dauerkatheter liegen. Später beim Katheterwechsel Gummikatheter Charr. 20. Röntgenaufnahme ohne Kontrastmittel zeigt am rechten Nierenbecken einen linsengroßen, nicht sicher als Stein anzufprechenden Schatten. Fisteln in der rechten Leistengegend lassen sich nicht sondieren. Bei der Leeraufnahme der Blasenengegend findet sich im Bereich des inneren Teiles des rechten horizontalen Schambeinaastes und des angrenzenden aufsteigenden Schambeinaastes ein eigroßer Schatten mit unregelmäßiger Begrenzung. Oberhalb dieses Schattens, in Höhe der Kreuzbeinmitte, ein kleinerer runder Schatten. Blutharnstoff nüchtern 0,248^{0/00}, 24 Stunden nach Harnstoffbelastung 0,347^{0/00}.

Am 30. 10. 35 in Avertin-Äther-Mischnarkose kleiner Querschnitt am oberen Rand der Schoßfuge durch die narbig veränderten Weichteile unter Einkerben der Ansatzsehnen der geraden Bauchmuskeln unter schrittweisem Vorgehen an den horizontalen Schambeinaästen. Man kam zunächst in eine Höhle, aus der sich stinkender, eitrig-er Urin entleert. Dadurch wird ein Stein freigelegt, der dem Schambein dicht angelagert ist und die Harnröhre nach hinten abgedrängt hat. Der Stein ist so fest eingemauert, daß er nur stückweise ausgebrochen werden kann. Nach vollständiger Entfernung resultiert eine Höhle, deren Boden von dem rechten absteigenden Schambeinaast gebildet wird. Nach Eröffnung der nach oben gedrängten Blase fühlt man mit dem tastenden Finger einen kastaniengroßen, weichen Stein. Beim Versuch, ihn in die Zange zu fassen, zerbröckelt derselbe; die Steintrümmer werden teils mit der Zange, teils durch Spülung aus der Blase entfernt. Ein Versuch durch Sondieren die Beziehungen der Fisteln in der rechten Leistengegend zur Blase und zu der Steinhöhle hinter den Schambeinen festzustellen, gelingt nicht, da sich die Fisteln nicht in ganzer Ausdehnung sondieren lassen. Nach Verkleinerung der Blasenschnittwunde Tamponade der paraurethralen Höhle hinter

den Schambeinäften, Einführung eines Gummidrains in die Blase, und Einführen eines dicken Dauerkatheters durch die Harnröhre in die Blase. Operationswunde in üblicher Weise versorgt. Nach Entfernung der Tamponade am 2. 11. und Einführung eines Drains in die Steinhöhle, allmähliche Verkleinerung der paraurethralen Höhle durch Ausfüllung derselben abwechselnd mit Dextropur-Campher und Ungentolan. Tägliche Spülung, dabei gelegentlich Entleerung kleinster Steinsplitter und zäher Schleimmassen mit sehr trübem Urin. Neubildung von Steinen wird durch noch nicht im Handel befindliches Präparat verhindert. Die paraurethrale Steinhöhle füllt sich allmählich vollständig aus. Die kontinente Blasenfistel wird offen gelassen, um bei erneuter Steinbildung in der Blase die Blasensteine von ihr aus entfernen zu können. Anlegen einer Blasenfistelbandage, tägliche Spülung der Blase nach Einführung eines leicht einzuführenden Katheters durch die Harnröhre in die Blase. Im Laufe der Behandlung haben sich die Fisteln am rechten Unterbauch und in der Oberschenkelgegend geschlossen. Urinentleerung ungestört, aber gehäuft. Ausgesprochene Hebung des Allgemeinzustandes. Gewichtszunahme 13,8 kg.

Bei H. hatte es sich um einen schweren Splitterbruch des Beckens gehandelt mit Zerreißung der Harnröhre. Nach der sofortigen chirurgischen Versorgung der Harnröhrenverletzung kam es zur Urinphlegmone, zur schweren Infektion der Blase (nekrotisierenden Cystitis), zur Bildung mehrerer Fisteln mit Urinabfluß und Abstoßung von Knochensplitter, die zum Teil operativ entfernt werden mußten. Mehrere Jahre befand sich H. in nervenärztlicher Behandlung wegen schwerer nervöser Störungen. Mehrfach kam es zu Abfzeßbildung an verschiedenen Stellen, die nach Abfzeßeröffnung gefolgt waren von Fistelbildungen mit Ausfluß von eitrigem Urin; der Urin entleerte sich dann ausschließlich durch die Fisteln. Der weitere Verlauf war kompliziert durch Hoden- und Nebenhodenentzündungen und Bildung von Blasensteinen, von denen einer um einen Knochensequester sich herumgebildet hatte. Öfters kam es zu Harnverhaltungen durch ventilartigen Verschuß des Blasenausgangs durch einen der gebildeten Blasensteine.

Bei der Aufnahme ins Johanniter-Krankenhaus bestanden in der rechten unteren Bauchgegend 3 eitrig-urinentleerende Fisteln. Im Röntgenbild wurde ein in der Blase liegender Stein nachgewiesen, außerdem ein großer, paraurethral in der Gegend der Schambeinäfte gelegener Stein. Nach diesem Röntgenbefund mußte der obere, rund-

liche Schatten als Blasenstein gedeutet werden, während der in der Schambeingegend gelegene, unregelmäßige Schatten wahrscheinlich nicht in der Blase lag.

Durch erneute Röntgenaufnahme nach Einspritzung von Thorotrast durch die Harnröhre in die Blase wurden die Verhältnisse einwandfrei geklärt. Der vordere Teil der Harnröhre war gut dargestellt, nicht verengert. Der hintere Teil wies verengerte Lichtung auf. Seitlich und vor diesem Teil der Harnröhre lag der unregelmäßige Schatten in der Schambeingegend, die geschrumpfte kugelförmige Blase war nach oben gedrängt, der Blasenstein durch die Kontrastmasse verdeckt.


Die Verhältnisse sind an dem beigefügten Bild, das nach einer Pause der Leer- und Kontrastaufnahme gefertigt ist, mit voller Sicherheit zu erkennen (Fig. 1). Neben dem bei der Leeraufnahme erkennbaren Blasenstein zeichnet sich außerdem der paraurethrale unregelmäßige Stein nahe der Harnröhre deutlich ab. Der Befund wurde durch die Operation bestätigt (Sig. 1).

Die Bildung des letzteren Steines kann nur dadurch erklärt werden, daß in der Harnröhre eine Fistel zurückgeblieben war, hinter der Schoßfuge gelegen, und daß es durch Austritt infizierten Urins durch diese Fistel in die umgebenden Weichteile zu einer Höhlenbildung gekommen war, in der sich zu Steinbildung führende Niederschläge von Harnsalzen abgelagert hatten.

Bei Fall 13 lagen ganz ähnliche Verhältnisse vor. Auch hier war eine Fistel in der Harnröhre an der Verengerungsstelle zurückgeblieben, die zu einer paraurethralen Höhlenbildung geführt hatte. Dadurch, daß diese paraurethrale Höhle eine zweite Fistel nach außen oberhalb der Schoßfuge hatte, war es nicht oder nur zu vorübergehender Harnansammlung in derselben gekommen, so daß Steinbildung infolge von Stauung ausblieb. Bei längerem Bestehen dieser Höhle wäre auch schließlich hier mit Steinbildung zu rechnen gewesen (vgl. Fig. 2).

Nach operativer Entfernung des Blasen- und paraurethralen Steines, der wegen seiner Härte nur stückweise ausgebrochen werden konnte, wurde nach Verödung der paraurethralen Höhle und Schluß


Fig. 1



Siehe Text Seite 30

B. St. Blasenstein. P. St. paraurethraler Stein. H. Harnröhre.

Fig. 2



Siehe Text Seite 30

Bl. Blase. F. Fistel. Cy. Cysterne. Str. Stricture. H. Harnröhre.

der in dieselbe mündenden Harnröhrenfistel vollständige Heilung auch der Fisteln in der rechten Unterbauchgegend erzielt. Ein Beweis, daß die Bauchfisteln ihren Ursprung in der Höhle hatten.

Die Blasenfistel wurde offen gehalten und mit Fistelbandage versehen, um im Falle erneuter Steinbildung die Steine nach Erweiterung der Fistel ohne Schwierigkeit entfernen zu können.

Das Fassungsvermögen der Blase hat sich erheblich gesteigert, der Urin ist noch schwer infiziert, macht weitere entsprechende Behandlung erforderlich. Eine Beteiligung der Nieren am Infektionsprozeß war bei der Entlassung nicht nachweisbar.

Nach den letzten Nachrichten befindet sich H. in ausgezeichnetem Zustand, zu lohnbringender Arbeit ist er nicht mehr fähig.

Dieser Fall stellt in seinem ganzen Verlauf mit all den schweren Komplikationen gewissermaßen ein Unikum dar. Um so erfreulicher ist das schließlich erzielte Resultat.

6. Th. He., Seilbahnarbeiter, 22 Jahre, Unfallstag: 11. 11. 30.

Bei der Einfahrt in die Grube Einklemmung zwischen Maschine und Gesteinswand. Bei der Aufnahme in das Städtische Krankenhaus zu Dillenburg: An der Außenseite beider Oberschenkel oberflächliche Hautabschürfungen, Haut am Hodensack hinten in der Mittellinie in mäßiger Ausdehnung blutunterlaufen. Becken in der Gegend der Schambeinfuge spontan und auf Druck schmerzhaft. An der Harnröhrenmündung etwas eingetrocknetes Blut. Harn konnte seit der Verletzung nicht gelassen werden, doch ist die Blase nicht gefüllt. Eine Harninfiltration nicht nachweisbar. Keine Bauchdeckenspannung, kein Erbrechen.

Auf der Röntgenaufnahme erscheint der Schamspalt außerordentlich breit, Beckenbruch ist nicht zu erkennen. (Auf einer späteren Aufnahme vom 5. 2. 31 ist deutliche Knochenneubildung an der linken Seite der Schamfuge erkennbar.)

Nach vergeblichem Versuch des Katheterismus, wobei der Katheter in eine Bluthöhle gerät, wird eine Blasenpunktion gemacht. Troikar bleibt liegen. Da sich der natürliche Weg nicht wieder herstellt, wird am 14. 11. in Narkose operiert. Äußerer Harnröhrenschnitt vom Damm aus. Aufsuchen und Naht der zerrissenen Harnröhre über einem Dauerkatheter. Während der Heilung Bildung eines Abszesses in der linken Leistenfalte und vorübergehende Harnfistel am Damm. Harnentleerung gut. Nachbehandlung ambulant mit Bougies. Bei der Entlassung am 23. 12. 30 Gang unbehindert. Harnröhre für Bougie Charr. 16 eben noch durchgängig.

Harn wird ohne Beschwerden in dünnem Strahl entleert, ist klar, frei von krankhaften Bestandteilen.

18. 7. 31 Harnröhre für Bougie Charr. 18 durchgängig. Die Blase wird nach einigem Zuwarten im Strahl entleert. Harn vollkommen klar. Wegen drohender Verengung der Harnröhrenstriktur stationäre Behandlung.

20. 11. 32. Durchgängigkeit der Harnröhre für Bougie Charr. 20. Harn wird nach einigen, wohl durch psychische Hemmung bedingte Bemühungen in gutem Strahl gelassen, ist klar und frei von krankhaften Bestandteilen. Man gewinnt den Eindruck, daß es sich nicht um eine eigentliche Harnröhrenverengung, sondern um eine Klappenbildung durch eine Schleimhautfalte in der Harnröhre handelt. Nur so ist es zu erklären, daß zuweilen ein starkes Bougie glatt passiert, ein andermal sich verfängt. Das linke Schambein wird an der fühlbaren Verdickung als druckempfindlich bezeichnet.

18. 1. 33. Ein Bougie Charr. 15 stößt in einer Entfernung von 14 cm vom Orificium externum auf einen festen schmerzhaften Widerstand. Von einer weiteren Bougierung wird im Interesse der folgenden Endoskopie abgesehen. Mit Endoskop Charr. 23, das ohne Schwierigkeit bis in eine Entfernung von 15 cm eingeführt werden kann, wird eine trichterförmige Verengung festgestellt, die hauptsächlich durch eine zum Lumen quer verlaufende Narbe gebildet wird. Schleimhaut hier blaß und atrophisch. Von einer Tasche nichts zu sehen. Beim Zurückziehen des Endoskops zwischen 15 und 13,5 cm wölbt sich in das Bild von oben ein breiter hyperämischer Schleimhautwulst vor, dessen Berührung sehr schmerzhaft ist. Die Einführung des Endoskops Charr. 21 für die hintere Harnröhre über 15 cm hinaus erweist sich wegen der bestehenden Striktur als unmöglich. Abbruch der Endoskopie wegen Schleimhautblutung. Eine Röntgenaufnahme der Harnröhre ergibt eine nahezu 2 cm lange sondendicke Verengung. Wasserlassen erfolgt beim Pressen in gutem Strahl. Der Urin klar, frei von Eiweiß, Zucker und krankhaften Formelementen. Es muß damit gerechnet werden, daß die Verengung mit der Zeit sich vergrößert.

Vom 27. 2. bis 5. 3. 33 wird He. im Städtischen Krankenhaus zu Dillenburg jeden zweiten Tag bougiert, und zwar durch schonende Behandlung mit Blei gefüllter Bougies in ganz allmählich steigender Stärke, wobei jedes Bougie etwa $\frac{1}{4}$ Stunde liegen bleibt. Bis zur Entlassung wurde die Durchgängigkeit der Harnröhre bis auf Charr. 25 gebracht. Im Vergleich zu dem am 18. 1. 33 erhobenen Befund hat sich der Zustand erheblich gebessert. Wie die Röntgenaufnahme der Harnröhre ergibt, ist die Verengung einwandfrei zurückgegangen.

21. 11. 33 Aufnahme ins Johanniter-Krankenhaus. Blutdruck R.R. 120/70 mm Hg. Auffallend ist starkes nervöses Gesichtszucken, sehr lebhafte Knie- und Achillessehnenreflexe und vermehrte Hautschrift. Harnröhre für Bougie Charr. 16 durchgängig. Mit Bougie Charr. 18 ist das Hindernis unter der Schamfuge eben noch zu überwinden. Die Verengung ist im Röntgenbild (Thorotrast als Kontrastmittel) einwandfrei zu erkennen, und zwar in Länge von 1 cm. Diese trichterförmige Verengung entspricht einer Lichtung von etwa Charr. 17. Bei der endourethralen Untersuchung sieht man die normale Harnröhrenschleimhaut unter der Schamfuge in einen starren Teil übergehen, der mit Luft nicht aufblähbar ist. Die Schleimhaut ist hier blaß, von kleinen geröteten Streifen unterbrochen. In der Mitte der narbigen Verengung eine grubchenförmige Einlenkung als Fortsetzung der Harnröhre. Die Harnröhrenverengung neigt zur Schrumpfung.

Da die Erfolge der unblutigen Behandlung nur vorübergehend sind und die Behandlung der intermittierenden stumpfen Erweiterung keineswegs schmerzlos ist, stellen sich bei He. nervöse Störungen ein, die objektiv nachweisbar sind in den sehr lebhaften Sehnenreflexen und dem Dermographismus. Der ursächliche Zusammenhang mit dem Unfall kann nicht abgelehnt werden. Es ist mit dem Auftreten weiterer Symptome zu rechnen, wenn He. sich nicht bereit erklärt, die Verengung operativ beseitigen zu lassen.

5. 9. 34. In der Medizinischen und Nervenkl. in Gießen konnte ein krankhafter Befund an den inneren Organen, besonders an den Nieren und den harnableitenden Wegen, nicht festgestellt werden. In der Zwischenzeit stand er wegen Harnröhrenstriktur, des Blasenkatarrhs und allgemeiner Nervenschwäche in Behandlung.

15. 10. 34. Vom Kreisarzt in Dillenburg wird eine Kur in einem Sanatorium für notwendig erachtet, da er wegen Nervosität arbeitsunfähig wird.

Vom 13. 11. bis zum 11. 12. 34 wird er in einem Sanatorium in Bad Orb wegen Nervenschwäche behandelt, und zwar wegen posttraumatischer Neurose, Überfunktion der Schilddrüse und Schwäche des Nervensystems. Blutdruck R.R. 130/60 mm Hg. Puls 108, Reflexe sehr lebhaft, Nervensystem sehr übererregt, Beschwerden psychogen stark überlagert. Urin ohne krankhaften Befund. Die ab und zu noch auftretenden Blasenbeschwerden werden günstig durch Diathermie und Urotropin beeinflusst. Nach Behandlung mit salzarter Kost, Trinkkur und Martinusquell, Dijodthyrofin und Nervobromin tritt sichtbare Besserung ein.

28. 1. 35. Interne Untersuchung im Brüder-Krankenhaus zu Bonn. Am Nervensystem keine objektiven Zeichen von allgemeiner nervöser Übererregbarkeit: kein Ruhe- oder Spreizzittern der Hände, keine Puls-

beschleunigung, keine abnorme lebhaftes Sehnenreflexe, keine Schwindelsymptome, Schlaf und Appetit gut, keine Störung des Geschlechtsverkehrs.

Ein im¹ Johanniter-Krankenhaus gefertigtes Haemogramm zeigt außer einer mittelmäßigen Lymphocytose (39) normale Blutverhältnisse. Ein festes Bougie Charr. 18 läßt sich unter leichtem Klemmen, aber sonst ohne Beschwerden, in die Blase einführen. Ein Vergleich mit der am 20. 11. 33 gemachten Röntgenaufnahme der Harnröhre nach Einspritzung von Thorarast zeigt, daß der verengerte Teil der Harnröhre an Länge zugenommen hat. Kein Blutaustritt aus der Harnröhre nach Harnröhrenspiegelung und Bougierung. Bei Aufforderung, die Blase zu entleeren, preßt He. mehr als zwei Minuten, ehe Entleerung erfolgt. Der Strahl ist ver schwächt und kraftlos. Keine Klagen über Schmerzen bei der Entleerung.

Es hat sich bei He. um eine Zerreißung der Schambeinfuge und der Harnröhre gehandelt. In Entfernung von 15 cm vom Orificium externum besteht eine Striktur, die durch eine derbe Narbe auf der Unterseite der Urethra gebildet wird. Diese Striktur, die für ein Bougie Charr. 18 eben noch durchgängig ist, neigt zur Schrumpfung. He. muß daher in bestimmten Zwischenräumen bougiert werden. Der distal von der Striktur sichtbare hyperämische, schmerzhaftes Schleimhautschwellung ist als entzündliches Infiltrat, entstanden durch die häufigen mechanischen Insulte, aufzufassen. Durch die schmerzhaftes Bougiebehandlung zwecks stumpfer Erweiterung der Striktur, die beim Aussetzen der Behandlung in Kürze von erneuter Verengung gefolgt zu sein pflegt, züchtet man Neurastheniker heran. Wenn auch die Hyperthyreose, die unabhängig vom Unfall besteht, für die Entstehung der nervösen Erscheinungen zum überwiegenden Teil bei He. mit verantwortlich zu machen ist, so sind die dadurch hervorgerufenen Störungen im Laufe der Zeit durch die schmerzhaftes Bougiebehandlung verstärkt worden und als Unfallsfolgen zu bewerten. Es muß deshalb solchen Patienten, die sonst nie aus ärztlicher Behandlung herauskommen, dringend geraten werden, sich die Harnröhrenverengung baldmöglichst operativ beseitigen zu lassen, damit nicht durch die Notwendigkeit weiterer schmerzhafter Bougiebehandlung Steigerung oder erneutes Auftreten nervöser Beschwerden erfolgt.

7. H. K., Bergmann, 30 Jahre, Unfallstag: 8. 5. 35.

Von hereinbrechendem Gestein vollständig verschüttet. Aufnahme ins Krankenhaus zu Mörs. In der Leistenbeuge links, gut handbreit von der Schamfuge bis über den vorderen, oberen Darmbeinstachel reichende Bauchdeckenschwellung, stark druckschmerzhaft. Weiterer Bluterguß unterhalb des rechten Darmbeinkammes. Kein Anhaltspunkt für eine Verletzung innerhalb der Bauchhöhle. Stauchungsschmerz des Beckens in der Schamgegend und an den Kreuz-Darmbeingelenken.

Die Röntgenaufnahme des Beckens und der Wirbelfäule: Sprengung der Schambeinfuge sowie der Kreuz-Darmbeingelenke mit Längsbruch des linken Darmbeins, nahe den eben genannten Gelenken, bedeutungsloser Abbruch des Endes vom linken Querfortsatz des 5. Lendenwirbels. Katheterurin vollkommen blutig. Mit Rücksicht auf den durch Verweilkatheter störungslos erfolgten Harnabfluß wurde die Blasen- und Harnröhrenverletzung in großen Weichteilblutergüssen nicht operativ angegangen.

15. 5. 35. Urin frei von Blutbeimengungen. Entstehung einer Urinphlegmone in der linken Leistenbeuge unter fieberhaften Temperaturen zwischen $38,4^{\circ}$ und 39° , am 23. 5. Incision. Aus der Drainagestelle entleert sich bis zum 19. 6. in abnehmendem Maße Urin neben Eiter. Heilung der Einschnittwunde. Im weiteren Verlauf Cystitis. Nachdem sich die Blasenentzündung etwas gebessert hatte, Entfernung des Verweilkatheters am 29. 7. 35. Am 6. 8. stand der Patient auf. Im Röntgenbild knöchern verheilter Längsbruch in der linken Darmbeinschaukel bei normaler Stellung der Kreuz-Darmbeingelenke und einem verbreiterten Schamfugenspalz mit unregelmäßiger Knochenstruktur. Gang des sehr korpulenten Patienten breitspurig und unbeholfen. Im Urin noch reichlich Leucocyten und Eitererreger.

18. 11. 35 frisch gelassener Urin klar, Reaktion sauer, Spuren von Eiweiß. Im Schleuderpräparat reichlich Leucocyten sowie einzelne Plattenepithelien nachweisbar. Fassungsvermögen der Blase 100 ccm.

Vom 17. 12. 35 bis 15. 2. 36 zwecks Untersuchung und Behandlung im Johanniter-Krankenhaus. Blutdruck R.R. $135/100$ mm Hg. Urin sauer, enthält geringe Mengen Eiweiß. Im Sediment Leucocyten in mäßiger Zahl, ebenso Stäbchen und Cocci, vereinzelt Blafendeckzellen. Gang stark hinkend. Die Schamfuge klafft fühlbar um mehr als 2 cm. Der linke horizontale Schambeinaft springt nach oben vor. Beim Stehen auf dem linken Bein, im Anfang mit Unterstützung, sinkt die rechte Beckenhälfte nach unten (Trendelenburg positiv). Bei der letzten Urinuntersuchung Zahl der Leucocyten nicht vermehrt, spärliche Erythrocyten und Niederschläge von Oxalaten. Zahl der Bakterien zugenommen. Metallbougie Charr. 20 stößt in der Gegend der Schoßfuge auf einen leichten

überwindbaren Widerstand. Nach Herausziehen des Bougies entleert sich ein Tropfen Blut.

3. 4. 36 Aufnahme in das Krankenhaus „Bethanien“ wegen Inkontinenzerscheinung. Urinuntersuchung ergab Eiweiß in Spuren, massenhaft Leucocyten, Erythrocyten und Bakterien. Die Behandlung bestand in zweitägigen Blasenpülungen, Verabreichung von Wärme und Harnreinigungsmitteln.

21. 4. 36 glattverlaufende Cystoskopie. Nur im Blafendreieck geringe Rötung der Schleimhaut. Stelle der alten Harnröhren- oder Blasenverletzung nicht erkennbar. Indigocarmin wurde aus beiden Harnleitern nach 5 Minuten kräftig und gleichmäßig ausgeschieden. Intravenöse Füllung der Nierenbecken ergab beiderseits geringe Zeichen einer chronischen Pyelonephritis. Bei Ablenkung der Aufmerksamkeit betrug der entleerte Blaseninhalt 150 ccm, ohne daß es zum unwillkürlichen Urinabgang gekommen wäre. Beim Stehen auf dem linken Bein ist ein sicheres Absinken der rechten Beckenschaukel nicht zu beobachten. Der sonstige Befund weicht nicht von dem im Johanniter-Krankenhaus erhobenen ab. Bei der Entlassung im Urin kein Eiweiß, nur wenige Erythrocyten und Bakterien, dagegen reichlich Leucocyten.

Die Unfallverletzung bestand also in einem Beckenringbruch (Schamfugenfrennung, Sprengung der Darmbein-Kreuzbeingelenke und Darmbeinschaukelbruch links) verbunden mit Verletzung der Blase bzw. der hinteren Harnröhre und ausgedehnten Weichteilblutergüssen in die Beckengegend, die durch Urinphlegmone kompliziert wurden.

Schon während der Behandlung kam es zur Verschiebung der linken Beckenhälfte nach oben. Das positive Trendelenburg'sche Phänomen konnte durch die scheinbare Beinverkürzung nicht erklärt werden, konnte nur seine Erklärung dadurch finden, daß die pelvitrochanteren Muskeln infolge der geänderten Verlaufsrichtung eine gewisse Insuffizienz zeigten. Durch Verordnung eines Schienenhülsenapparates, der bei Kräftigung der Muskeln weggelassen wird, und Stiefeln mit erhöhter Sohle war K. imstande ohne Stock mit bemerkenswerter Sicherheit zu gehen. Das Trendelenburg'sche Phänomen ist jetzt bereits negativ.

Blasenkatarrh und Harnröhrenverletzung bedürfen weiterer Beachtung vor allem, da Gefahr einer weiteren Verengerung der Harn-

röhre nicht auszuschließen ist und einer aufsteigenden Infektion beizugehen geübt werden muß.

8. A. Ki., Kohlenhauer, 26 Jahre, Unfalltag: 14. 12. 17.

Ki. wurde durch fallendes Gestein verschüttet. Bei der Krankenaufnahme in Mörs: Hautabschürfungen an der linken Körperseite und am Unterschenkel. Urinlassen selbsttätig unmöglich. Beim Katheterisieren entleert sich aus der Harnröhre Blut; der aus der Blase entleerte Urin ist klar. Im Röntgenbild: Bruch des Beckens in der Schamfuge. Ambulant wird er zur Verhinderung einer stärkeren Verengerung der Harnröhre weiter bougiert.

27. 4. 18. Brennen an der Verletzungsstelle beim Wasserlassen, Schmerzen im Becken nach längerem Gehen. Oberhalb der Schamfuge kleinfautgroße, knöcherne Verdickung fühlbar. Rechte Beckenhälfte steht deutlich höher als links. Rechte Kreuz-Darmbeinfuge etwas verdickt, springt vor. Gang noch ganz leicht hinkend. Bougiebehandlung.

30. 8. 18 Kreuz-Darmbeinfuge rechts noch schmerzhaft, springt stärker vor. Urin in mäßig dickem Strahl entleert, enthält keine krankhaften Bestandteile. Allgemeinzustand noch geschwächt, da Ki. eine schwere, rechtsseitige Lungenentzündung durchgemacht hat.

11. 4. 19 Urinbefund unverändert.

20. 2. 20 erhebliche Verengerung der Harnröhre, Urinentleerung nur noch tropfenweise. Feinste Bougies passierten nicht mehr die Verengungsstelle. Deshalb wurde dieselbe am 24. 2. 20 durch Operation in örtlicher Betäubung freigelegt.

Es stellte sich heraus, daß die vom Beckenbruch ausgegangenen Knochenwucherungen die Harnröhre umlagerten und fast vollständig verschlossen hatten. Abmeißelung der Callusmasse und Freilegung der Harnröhre. Danach guter Heilverlauf mit vorübergehender Urinfistel am Damm. 17. 4. 20 Entlassung. Urinstrahl bei Bewegung ziemlich gut; nur nach Ruhe schwächer. Operationswunden am Damm und Hodensack fest verschlossen. Harnröhre im hinteren Teil noch deutlich verhärtet und verdickt. Durchgängigkeit für Bougies auch jetzt nicht möglich (wegen des geschlängelten Verlaufs durch die Callusbildung).

4. 7. 22 Harnröhre in der Gegend der Narbe erheblich verdickt und hart, zeitweise Fistelbildung am Damm. Wasserlassen wechselnd stark erschwert.

23. 7. 24 Fistel am Damm völlig geschlossen, wesentliche Besserung. Ki. verrichtet schwere Arbeit.

Vom 26. 4. 25 wurde er im Krankenhaus „Bethanien“ wegen nahezu vollständigen Verschlusses der Harnröhre bis zum 16. 5. 25 stationär be-

handelt. Durch Bougierung und entsprechende Behandlung wurde eine Besserung erzielt.

Seit 21. 6. 26 Urinlassen erschwert, regelmäßige Bougierung. Verengung der Harnröhre im Bereich des Schambeins hochgradig.

19. 7. 28. Ki. arbeitet wieder vor Kohle. Becken frei. Als Unfallsfolge besteht nur noch die Harnröhrenverengung. Sie bewirkt praktisch keine Erwerbsverminderung, Rente fällt daher fort (unter 10%).

Vom 26. 9. 29 bis zum 11. 4. 31 wegen vermehrter Beschwerden bei der Urinentleerung in ambulanter Behandlung. In der Dammnarbe bildete sich zeitweise eine Urinfistel.

13. 6. 31. Harnretention ging infolge der Bettruhe nach einigen Tagen zurück. Nur die feinsten Bougies passierten die Verengungsstelle. Ärztlich wurde objektiv ein Entleeren von Urin aus der Dammfistel festgestellt.

21. 9. 31 Anschwellung und erhebliche Entzündung an der linken Gefäßhälfte, aus der sich Eiter und Urin entleert. Seitdem hat sich dort eine neue Fistel gebildet, etwa 3 cm links neben der alten Dammfistel. Die Ausgießung der Fistel mit Jodipin ergibt im Röntgenbild einen von der linken Gefäßhälfte an der Harnröhre vorbei bis in die rechte Gefäßhälfte reichenden Fistelgang.

18. 12. 31 operatives Ausschneiden der Fistel. Es stellte sich heraus, daß die Fistel bis hinter die Symphyse ging, eine Freilegung derselben nicht möglich. Anfangs Heilung, bricht dann wieder auf. Es wurde vorgeschlagen eine fachärztliche Untersuchung in Bonn vornehmen zu lassen.

29. 2. 32 ergibt Untersuchung im Johanniter-Krankenhaus haardünne, nicht sondierbare Fistel im Bereich der grubchenförmigen Vertiefung der Dammnarbe, aus der sich bei der Blasenentleerung Urin in kleinen Tropfen entleert. Eine Kommunikation mit der Harnröhre besteht demnach zweifellos. Am inneren Teil der linken Gefäßfalte zwei Fisteln. Die mediane läßt sich nur 1,5 cm tief sondieren; bei der Sondierung der lateralen Fistel führt die Sonde schräg nach innen nach der Schamfuge hin. Urinentleerung aus dieser Fistel wird nicht beobachtet. Ein in die Harnröhre eingeführtes festes Bougie, ebenso filiformes, stößt an der Stelle der grubchenförmigen Einziehung der Dammnarbe auf einen unüberwindlichen Widerstand. Die ganze Gegend oberhalb der Schamfuge weist eine knöcherne Auftreibung auf. Eine Auffüllung der lateralen Gefäßfistel mit Kontrastmittel (Thorotrast) von der Fistel aus gelingt nicht, da die Kontrastflüssigkeit nach Einspritzung von 2 ccm sofort zurückfließt. Dagegen gelang es die Fistel mit ihren Verzweigungen nach der rechten Gefäßbacke durch Einspritzung in die Harnröhre aufzufüllen. Die Blase ist mit Kontrastmittel angefüllt, scheitelwärts ausgezogen. Da im Röntgenbild eine Kommunikation der Blase mit der Ge-

fäßfistel nicht festzustellen ist, muß die Quelle der Fistel im Bereich der Verengung der Harnröhre liegen, wahrscheinlich an der Stelle, an der der Fistelgang die verengerte Harnröhre kreuzt. Operation der Harnfisteln abgelehnt.

Anfang September 32 bildet sich neben der lateralen eine neue eiterabsondernde Fistel, die bald vernarbt.

12. 1. 33. Während aus der Dammfistel kein Harn austrat, entleerte sich aus der linksseitigen Gefäßfistel bei Entleerung der Blase Urin in schneller Tropfenfolge. Austreten von Urin auch während des Gehens. Einmündung der Fistel wahrscheinlich an der Grenze von Blase und Harnröhre.

6. 11. 33 erneut Aufnahme ins Johanniter-Krankenhaus. Blutdruck R.R. 110/75 mm Hg. Die Blasenentleerung erfolgt in einem schwachen, etwas gedrehten kraftlosen Strahl. Selbst filiforme Bougies passieren nicht die Verengung der durch die Callusmassen gewundenen, starren Harnröhre. Im Bereich der Knochenwucherung sind im Röntgenbild kleine Thorotrastdepots erkennbar, die den Verlauf der Harnröhre vermuten lassen. Bei Entleerung durch die Harnröhre spritzt gleichzeitig in dünnem Strahl Urin in etwa gleicher Menge aus der Gefäßfistel hinter dem rechten Oberschenkel vorbei. Nach Aufhören der Urinentleerung entleeren sich bei Drehung des Körpers nach links aus der Gefäßfistel noch etwa 16 ccm in dünnem Strahl. Urin trübe, zeigt starke Eiweißreaktion, enthält Leucocyten, Coccen und Harnröhrendeckzellen. In dem eitrigen Sekret der Harnröhre mikroskopisch massenhaft Leucocyten und Staphylococcen. Im Röntgenbild nach Urofelektaneinspritzung: Rechte Niere steht tiefer, rechtes Nierenbecken verbildet, etwas erweitert, Nierenkelche nicht dargestellt. Verlauf des Harnleiters vom Abgang aus dem Nierenbecken nicht zu erkennen. Vorschlag einer Blasenfistel, weil damit gerechnet werden könnte, daß sich die linke Gefäßfistel dauernd schließt.

13. 1. 34 Blutdruck R.R. 110/75 mm Hg. In Avertin-Äther-Narkose Freilegung der Blase durch Querschnitt über der Schoßfuge. Bildung einer schlußfähigen Blasenfistel mit Einführung eines Gummikatheters. Dammfistel noch gelegentlich nässend. Urinentleerung aus der Gefäßfistel erfolgt nur bis zu 1 ccm, zeitweise geschlossen. 27. 2. 34 Blasen Spiegelung durch die Blasenfistel: Blasen Schleimhaut etwas gewulstet. Schleimhautzeichnung an einzelnen Stellen verwaschen, Gefäßzeichnung teilweise erhalten, Umgebung der Harnleiter etwas gerötet.

An der Ausmündung der Blasenfistel im Bereich der Bauchhaut Granulationswucherung, die mehrfach abgetragen und geätzt werden muß. Da Neigung zur Inkrustation des Katheters besteht, häufiges Auswechseln. Ki. trägt einen Blasenfistelverschlußapparat und hat Katheterwechsel ein-

wandfrei erlernt. Der Blasenpiegelbefund entspricht dem Urinbefund, der durch die Operation nicht beeinflusst werden konnte.

30. 4. 35 Blutdruck R.R. 135/80 mm Hg. Dammfistel durch einen Granulationsknopf gekennzeichnet. Aus der Oberschenkel fistel in der Gefäßfalte Entleerung erheblicher Mengen blutig-eitriger Flüssigkeit ohne Nachtropfen von Urin. Beim Einfüllen von wenig über 100 ccm Spülflüssigkeit erfolgt heftiger Blasenkrampf. Die Blasenschleimhaut intensiv gerötet mit kammartiger Wulstung, Gefäßzeichnung vollständig verloren gegangen, hier und da eitrige Beläge. Urin alkalisch, mikroskopisch Coli-Bazillen, Coccen, Leucocyten, spärliche Erythrocyten und Blasendeckzellen. Untersuchung vom Mastdarm aus ergab eine deutlich tastbare Verdickung und Knochenwucherung hinter der Schoßfuge, besondere Druckschmerzhaftigkeit des absteigenden Schambeinastes neben der Schoßfuge rechts. Links wölbt sich die Darmwand regelwidrig vor.

Im Röntgenbild findet sich unter der Schoßfuge eine derbe, bogenförmige Knochenwucherung. Oberhalb der Schoßfuge deckt sich die daselbst befindliche Wucherung zum Teil mit dem Schatten der unteren atrophischen Hälfte des Kreuzbeins, so daß beide Schatten schwer auseinander zu halten sind. Im absteigenden rechten Schambeinast findet sich ein unregelmäßig rundlicher Defekt, der der bogenförmigen Knochenwucherung angelagert ist. Die Knochenwucherung um die Harnröhre hat zugenommen, so daß sie vollständig undurchgängig ist. Wäsche und Kleider werden durch die wechselnde Entleerungen der Gefäßfisteln beschmutzt.

Bei Ki. hat es sich um einen schweren Beckenbruch mit Harnröhrenzerreißung gehandelt. Es ist zu einer schweren Verengung der Harnröhre gekommen, kompliziert durch Knochenwucherungen um die Harnröhre herum unterhalb der Schoßfuge. Es bildeten sich zwei Harnröhrenfisteln aus, die eine am Damm, die andere in der linken Gefäßfalte; beide sich gelegentlich schließend, doch stets wieder aufbrechend.

Wie durch ein Kontraströntgenbild nachgewiesen werden konnte, stand die Gefäßfistel mit dem verengerten Teil der Harnröhre in Verbindung. Operative Beseitigung der Harnröhrenverengung und der Fistel mußte betreffs Dauererfolges als zweifelhaft angesehen werden wegen des durch Knochenwucherungen gewundenen Verlaufs. Da die im Strahl erfolgte Urinentleerung aus der Gefäßfistel mit starker Beschmutzung von Wäsche und Kleidern zum unerträglichen Zu-

stand wurde, legte man eine Blasenfistel an mit gutem Verschlußapparat, die sich besonders auf die Gefäßfistel günstig auswirkte.

Trotz Behandlung wurde der Blasenkatarrh hochgradig und griff auf die rechte Niere über, an der jedoch eine starke Funktionsstörung noch nicht nachgewiesen werden konnte. Durch intermittierende Eiterverhaltung der Gefäßfistel wurde der Knochen des rechten Schambeinaftes an der Stelle, an der die Fistel endigte, wie schon frühere Aufnahmen ergaben, arrodiert und stark verändert.

9. A. R., Schlepper, 22 Jahre, Unfallstag: 7. 5. 27.

Beim Rangieren geriet R. mit dem Becken zwischen Stoßmauer und Lokomotive. Im Krankenhaus zu Mörs folgender Befund: An der Außenseite der rechten und linken Hüfte Hautabschürfungen, fast völlige Bewegungsbehinderung beider Beine, Zusammendrücken des Beckens sehr schmerzhaft, Wasserlassen spontan unmöglich. Beim Katheterisieren kein Urin, nur Blut. Zunehmende Schmerzen und Blasendämpfung. Im Röntgenbild Fraktur der rechten Beckenschaufel und Abbruch der Schambeinfuge beiderseits, so daß alle vier Schambeinäste je fingerbreit seitlich der Schamfuge abgebrochen sind.

In Narkose vom Damm aus Auffuchen der Harnröhre. Die abgerissenen Enden der Harnröhre am Blasenhalss werden über Katheter durch Naht vereinigt. Einlegen eines Dauerkatheters. Später Beckenstrecke. Nach Entfernung des Dauerkatheters kann Urin spontan in dickem Strahl gelassen werden. Bei der Entlassung am 7. 9. 27 Bruchstellen noch etwas druckempfindlich. Zusammendrücken der Beckenschaufeln schmerzlos. Abduktion im Hüftgelenk etwas eingeschränkt, sonstige Bewegungen frei. Gang fast normal. Harnröhre wenig verengt, neigt zur Schrumpfung; deshalb zweimal wöchentlich Katheterismus. Urin noch ziemlich trüb, eitrig ohne Eiweiß, reichlich Bakterien.

Gegen die Festsetzung einer Rente von 25 % Berufung eingelegt, daher am 28. 11. 27 Aufnahme ins Johanniter-Krankenhaus. Gang unbeholfen, leicht watschelnd. Im Röntgenbild unterhalb der Schambeinfuge ein losgerissenes, nicht knöchern angeheiltes, bohnergroßes Knochenstück. Die Grenzen der linken Kreuzdarmfuge verwaschen, kaum erkennbar; oberhalb derselben ein undeutlicher Knotenschatten. Bougierung gelang nur bis Charr. 18. Die Einführung eines Cystoskops von gleichem Kaliber gelang nicht. Am gleichen Abend Schüttelfrost. Temperatur 40,4°, am nächsten Tage 39°, dann Abfall der Temperatur zur Norm. Harnröhre neigt zur Schrumpfung. Im Urin wechselnde Mengen von Leucocyten, Coccen und Stäbchen, einige Epithelfetzen und wechselnder Eiweißgehalt. Eitriger Blasenkatarrh mittleren Grades. Rente: 40 %.

Vom 12. bis 30. 1. 28 wegen Nierenschmerzen vom Knappschaftsarzt behandelt.

9. 3. 28 Nachuntersuchung in Mörs. Beckenschwäche immer noch erheblich. Urin klar bis auf spärliche Flocken, sauer, frei von Eiweiß. Harnröhre muß einmal wöchentlich bougiert werden.

Vom 28. bis 30. 6. 28 zur genauen Untersuchung im Krankenhaus „Bergmannsheil“ in Bochum. Gang ohne Behelfsmittel auf ebener Erde in geringem Ausmaße watschelnd, jedoch flott und sicher. Das Röntgenbild des Beckens läßt die Druckschmerzhaftigkeit der verletzten Knochenstellen glaubhaft erscheinen. Eine Röntgenkontrastaufnahme der Harnröhre mit Jodipinlösung zeigt eine etwa 2—3 cm lange Verengung der Harnröhre, deren engste Stelle 2—3 mm beträgt, und die bis zum Blasen Hals reicht. Am 30. 6. 28 gelingt die Bougierung der Harnröhre nur bis Charr. 10, wobei die Striktur an der Rupturstelle deutlich wahrnehmbar ist.

Da 1927 Einführung eines Bougies Charr. 18 noch möglich war, hat sich eine Verschlechterung der Durchgängigkeit der Harnröhre ausgebildet, die systematisch ambulant weiter gedehnt werden muß. Der spontan gelassene Urin klar, enthält mikroskopisch Leucocyten und Epithelien.

In Übereinstimmung mit Prof. Bunge auch weiterhin Erwerbsminderung 40%.

Da die ambulante Behandlung mit medikamentöser Blasenpülung (Rivanol und Arg. nitr.) keine Erfolge erzielte, Aufnahme am 10. 6. 29 ins Städtische Krankenhaus Mörs wegen allmählich zunehmender Verengung der Harnröhre, hartnäckiger Blasenentzündung und allmählich auftretender Urinfistel am Damm.

Striktur hochgradig, sehr derb, nicht erweiterungsfähig. Stärkere Absonderung der Urinfistel in der alten Narbe; deshalb wurde am 17. 7. 29 die Urinfistel am Damm umschnitten, wobei sich zeigte, daß die ganze Umgebung der Narbe eine einzige derbe Schwiele war, hervorgerufen durch die Urinfistel. Das ganze Gewebe ödematös durchtränkt. Exstirpation des schwieligen Gewebes bis an die Harnröhre, Harnröhre selbst nicht eröffnet, Wunde tamponiert. Allmähliche Heilung. Urinfistel nahezu geschlossen. Harnröhre für mittelstarke, sogar weiche Katheter von Charr. 19 gut durchgängig.

15. 10. 29 Dammgegend bis auf eine ganz kleine, trockene Fistel geheilt. Die harte Infiltration und Schwiele verschwunden. Nach 10 minutenlangem Gehen stellen sich Beschwerden an der Blase ein. Beim Urinlassen zusammenziehendes Schmerzgefühl. Urinentleerung nachts alle 2 Stunden, tagsüber alle 3—4 Stunden. Der alkalische Urin noch trüb, Eiweiß $\frac{1}{2}^{0/100}$ ging leicht in dickem Strahl ab. Mikroskopisch reichliche aus den tiefen Harnwegen stammende Leucocyten und vereinzelte Blasenepi-

thelien, außerdem einzelne zweifelhafte Leucocytenzylinder und reichlich Ammoniak-Magnesia-Kristalle.

2. 12. 29 wiederum stationäre Behandlung in Mörs, da R. sich mehrfach dem Katheterisieren und dem Ausspülen der Blase entzog. Beim Katheterisieren mit weichem Katheter Charr. 17 zwecks Spülung der Blase gelangt man am Blasen Hals auf ein relatives Hindernis, das aber überwunden werden konnte. Einführung dickerer Katheter gelang nicht. Da das tägliche Katheterisieren nicht vertragen werden konnte, wurde später alle zwei Tage die Blase gespült, zugleich auch dilatiert, was mit Bougie Charr. 22 wesentlich leichter gelang als mit dünnerem Nelaton-Katheter. Es ist somit die Verengerung am Blasen Hals offenbar mit einem Krampf vergesellschaftet. Beim Urinieren im Liegen entleeren sich aus einer granulierenden Fistel am Damm, 2 Querfinger vor dem After etwa 40 ccm Urin, während im Stehen keine Entleerung stattfand. Mit der Sonde gelangt man bis auf den in die Harnröhre eingeführten Katheter. Im Urin 1^{0/100} Eiweiß. Reaktion schwach sauer bis neutral. Sonst kein krankhafter Urinbefund. Es wird angenommen, daß die Cystitis durch einen Abfluß oder eine Erweiterung der tiefen Blasen fistel in der Einmündung derselben in die Blase unterhalten wird.

20. 1. 30 in Bougiebehandlung des Knappschafstsarztes.

R. ging dann eigenmächtig in eine Privat-Klinik nach Düsseldorf. Dort wurde ein Blasen stein festgestellt und operativ entfernt. Gleichzeitig auch die Harnröhren fistel operativ geschlossen.

14. 3. 30 zwecks Behandlung Aufnahme ins Johanniter-Krankenhaus. Harnröhre für Bougie Charr. 20 gut durchgängig. Urinentleerung ungestört. Im Urin Eiweiß in mäßiger Menge. Im Sediment zahlreiche Leucocyten und Diplococcen, vereinzelt Streptococcen. 4. 4. 30 Kolikschmerzen in der rechten Nierengegend mit Temperatursteigerung. Nach intravenöser Einspritzung von Trypoflavin normale Temperatur. 12. 4. 30 nach Bougierung bis Charr. 26 Blasen spiegelung und Harnleiter sondierung: Blasen schleimhaut diffus geschwollen, Gefäßzeichnung verwachsen, im Trigonum Blutaustritt in die Schleimhaut. Nach Einführung des Harnleiterkatheters bis ins linke Nierenbecken reichliche Entleerung von klarem Urin, frei von Eiweiß, Bakterien und krankhaften Formbestandteilen; rechts trotz Einführung des Harnleiterkatheters bis ins Nierenbecken und trotz Durchspülung überhaupt kein Urin (reflektorische Anurie?). Der rechte Harnleiter liegt starr ohne Bewegung. Auf injiziertes Indigocarmin entleert sich aus demselben innerhalb 15 Minuten kein gefärbter Urin strahl, während links sich nach 7 Minuten ein schwach gefärbter Strahl zeigt. Bei einer Uroelektannierenaufnahme linke Niere normal, rechter Nierenschatten weniger gut erkenntlich, im unteren Kelch ein steinverdächtiger Schatten, Nierenbecken in mäßigem Grade erweitert. Eine wei-

tere Nierenbeckenaufnahme ohne Füllung zeigt erbsengroßen Nierenstein im rechten, unteren Nierenkelch. Wegen Verschlimmerung des Blasenkatarrhs unterbleibt erneuter Versuch der Harnleiterfondierung, Nierenfunktionsprüfung unmöglich.

Am 24. 5. 30 gelang der Harnleiterkatheterismus mühelos auf beiden Seiten. Der aus beiden Nieren getrennt aufgefangene Urin trüb; die mikroskopische Untersuchung beider Urine ergab mäßige Menge von Eiweiß und Leucocyten. Im Urin der linken Niere Coli-Bazillen nachweisbar, rechter Nierenurin bakterienfrei. Harnstoffgehalt nach vorheriger Belastung rechts 12,5^{0/00}, links 19^{0/00}. Es bestand mithin Funktionsstörung beider Nieren, rechts stärker als links. In einem Röntgenbild (nach Uroselectaneinspritzung) tritt jetzt in der linken Niere ein deutlicher Schatten von etwa Mandelkerngröße hervor, offenbar ein Stein.

Eine am 28. 5. 30 vorgenommene Pyelographie mit Einspritzung von Uroselectan ins Nierenbecken zeigt, daß der Stein im unteren Nierenkelch liegt. Im Gesamturin schwankt der Gehalt an Leucocyten und Bakterien in weiten Grenzen. Am 13. 6. 30 trat in der vernarbten Harnröhrenoperationswunde eine kleine Fistel auf, aus der sich bei der Blasenentleerung Urin entleert. Nach täglicher Ätzung am 20. 6. 30 geschlossen. R. bougiert sich selbst sehr geschickt mit Bougie Charr. 22.

11. 7. 30 morgens heftiger Schmerzanfall, von der rechten Nierengegend nach der Blase ausstrahlend. Nach Morphium und lokaler Wärmeapplikation Nachlassen der Schmerzen. 12. 7. 30 Beschwerden beim Wasserlassen, dabei Gefühl, als wenn ein Fremdkörper vor der Blase läge.

13. 7. 30 kirschkerngroßer Stein mit dem Urin durch die Harnröhre entleert. Röntgenuntersuchung der Nieren ergibt, daß der Stein aus der rechten Niere ausgestoßen ist. Erbsengroßer Stein in der linken Niere erscheint gegen früher etwas vergrößert. Rechtes Nierenbecken bakterienfrei, links besteht Nierenbeckenkatarrh mit Steinbildung. Rente 60%.

9. 9. 31 Entleerung von Eiter aus der Dammfistel, beim Urinieren in liegender Stellung teils tropfenweise, teils in dünnem Strahl Urin. Nach Ausstoßung des kirschkerngroßen Nierensteines hat rechts erneute Steinbildung nicht stattgefunden. Neben 5 früheren nachweisbaren kleinen Steinen hat sich in der Zwischenzeit links ein großer Stein gebildet, der das ganze Nierenbecken ausfüllt und Verästelungen in die beiden unteren Nierenkelche schickt. Da die jetzt vorhandenen Steine sich nicht durch die verhältnismäßig ungefährliche Pyelotomie entfernen lassen, sondern nur durch die wegen der Nachblutungsgefahr gefährlichere Nephrotomie, verweigert R. die Einwilligung zur Operation.

24. 3. 32 erneute Aufnahme ins Johanniter-Krankenhaus. Die Blase zeigt bei der Cystoskopie die Erscheinungen einer hochgradigen, eitrighämorrhagischen Entzündung mit Verlust der Gefäßzeichnung und Blut-

austritten in die Schleimhaut am Blasenhals. Der getrennt durch Harnleiterkatheterismus aufgefangene Urin jetzt rechts stark eitrig getrübt, links blutig-eitrig. Der Harnstoffgehalt nach Harnstoffbelastung beträgt rechts 17,5^{0/00}, links 11^{0/00}. Dieser Befund weist auf hochgradige Schädigung der linken Niere hin, auf Störung der Nierenfunktion rechts, sowie auf hochgradigen, beiderseitigen, eitrigen Nierenbeckenkatarrh mit Übergreifen der Erkrankung auf die Nierensubstanz.

Ein unter dem unteren rechten Nierenpol gelegener steinverdächtiger Schatten entspricht wahrscheinlich nicht einem Nierenstein, sondern Verkalkungen in den Weichteilen außerhalb der Nieren. In der linken Niere findet sich ein das ganze Nierenbecken ausfüllender und in die Nierenkelche sich fortsetzender Korallenstein, der an den Spitzen der Kelche isolierte, kleine Steine erkennen läßt. Der Stein hat geradezu groteske Form und Größe. Wegen der geringen Schattenbildung des Steines handelt es sich wahrscheinlich um einen Mischstein aus harn- und phosphorsauren Salzen. Mit Rücksicht auf den schweren, eitrigen Nierenkatarrh, der auf die Nierensubstanz selbst übergegriffen hat, und auf die ungenügende Funktion der rechten Niere, muß von einer Operation der linken Niere abgesehen werden. Rente 70%.

3. 4. 33 Zustand nicht wesentlich geändert.

11. 6. 33 beim Wasserlassen und bei den hier vorgenommenen Blasen-spülungen entleert sich aus der Dammfistel Urin und Blasenfüllflüssigkeit tropfenweise. Entzündungserscheinungen in der Harnröhre und Blase haben trotz systematisch durchgeführter Behandlung zugenommen. Im unteren Teil der linken Nierensubstanz haben sich neue Steine gebildet. Der Blutharnstoff nüchtern beträgt 0,24^{0/00}, 24 Stunden nach Harnstoffbelastung 0,36^{0/00}; Werte also unterhalb der höchsten Normalgrenze. Die Gesamtnierenfunktion hat mithin noch nicht gelitten.

29. 3. 34. Der Stein der linken Niere bei Vergleich mit früheren Aufnahmen an Größe zugenommen, jetzt hirschgeweihform. Im Nierenbecken und seinen Fortsätzen in die oberen Kelche ist er kompakt, in den unteren Kelchen fragmentiert, getrennte Steine verschiedener Größe bis in die Nierenrinde hinein. Dammfistel offen.

24. 8. 34 Blasenkatarrh hochgradig. Indigocarmin wird verzögert ausgeschieden. Noch eindrucksvoller tritt die Schädigung beider Nieren zutage bei der Harnstoffbestimmung bei getrennt aufgefangenen Urinen. Links erreichte die Harnstoffkonzentration die Höhe von 13,5^{0/00}, rechts nur eine solche von 14,5^{0/00} trotz mehrtägiger Harnstoffbelastung.

Weiterer Verlauf unbekannt.

Im Gefolge des Beckenbruchs mit Harnröhrenzerreißung war es trotz der mehrfachen Operationen zur Frühstriktur, zu Harnfisteln,

zu schwerem Blasenkatarrh, zu Steinbildungen in der Blase und in beiden Nieren gekommen.

Die Blasen- und Nierensteinbildung ist als indirekte Folge des Unfalls zu bewerten. An den Nieren wie an der Blase ist die Steinbildung bei dem zur Steinbildung neigendem R. durch die Infektion hervorgerufen. An den Nieren handelt es sich um eine sogenannte sekundäre Eitersteinniere, das heißt, um eine sekundäre Steinbildung bei bestehender Niereninfektion. Eine operative Entfernung der Steine war von vornherein wenig aussichtsvoll. Nach dem schnellen Wachstum der Steine und bei der dauernden Neubildung von kleineren Steinen mußten die Aussichten einer operativen Steinentfernung als absolut ungünstig betrachtet werden. Es war fraglich, ob es gelingen würde auch die kleinsten, im Röntgenbild sichtbaren Steine restlos zu entfernen. Bleibt aber nur ein kleiner Steinbröckel zurück, so bildet sich unweigerlich ein neuer größerer Stein. Aber selbst wenn es gelungen wäre, alle Steinbröckel restlos zu entfernen, so würde die Infektion der Niere und des Nierenbeckens eine erneute Steinbildung begünstigen, die selbst durch Drainage der Niere und anschließende Spülungen nicht mit Sicherheit zu vermeiden wäre.

Bei Eitersteinniere müssen in solchen Fällen gelegentlich in entsprechenden Abständen mehrfach Nierenoperationen zur Entfernung der Steine im Laufe der Jahre gemacht werden.

Prof. Bunge hat in einem ähnlichen Fall 6mal operativ im Laufe von 20 Jahren eingreifen müssen. Die Steine bildeten sich immer wieder neu. Die betreffende Patientin ist schließlich an erneuter Steinbildung mit Urämie zugrunde gegangen.

Während bei R. der Urin der rechten Niere 1931 bakterienfrei war, so daß man hoffen konnte, daß erneute Steinbildung in dieser Niere nicht auftreten würde, ergab die mikroskopische Untersuchung des rechten Nierenurins 1934, daß die Niere weitgehend infiziert war. Der ungünstige funktionelle Ausfall beweist, daß neben dem Nierenbecken bereits die Nierensubstanz in starkem Maße in Mitleidenschaft gezogen ist. Zwar ist die Gesamtfunktion noch eine ausreichende, wie die Untersuchung des Blutharnstoffes nach mehrtägiger Harnstoffbelastung beweist. Der Blutharnstoffgehalt bleibt unter der physiologischen Höchstgrenze.

Der sicherste Weg, in solchen und ähnlichen Fällen eine Heilung oder wenigstens einen an Heilung grenzenden Zustand zu erreichen, wäre die Exstirpation der Steinniere. Diese Operation wäre bei der ungünstigen Funktion der rechten Niere bei R. ein Wagnis trotz des günstigen Blutharnstoffes. Es müßte mit dem Versagen der rechten Niere gerechnet werden. So bleibt nur übrig, die bisherige Behandlung fortzusetzen und den Verletzten seinem Schickal zu überlassen.

10. F. Ru., Hauer, 28 Jahre, Unfallstag: 19. 7. 30.

Verfchüttung durch Gestein aus dem Hangenden. Aufnahmebefund im Krankenhaus zu Bardenberg: Aus der Harnröhre tropfenweise Entleerung von Blut, Katheterisierung nicht möglich. Im Röntgenbild mehrfacher Bruch des linken aufsteigenden und queren Schambeinastes. In Lumbalanästhesie Dammschnitt, Eröffnung eines großen Blutergusses. Harnröhre an der Blase abgerissen. Einführung eines Katheters bis in die Blase. Naht der Harnröhre. Heilung der Dammwunde glatt. Verlauf in der Folge durch rechtsseitige Nierenbeckenentzündung, welche immer mit Frösten und hoher Temperatur aufflackerte, gestört. Dadurch Allgemeinbefinden verschlechtert. Harnröhre dauernd gut durchgängig bei spontanem Urinieren.

Entlassungsbefund am 26. 1. 31: Verbreiterung des linken queren Schambeinastes, Verminderung der Muskulatur des linken Beines mit leichter Behinderung des Abspreizens, beim Bücken springt linke Lendengegend etwas nach hinten vor. Verschlimmerung durch aufflackernde Nierenbeckenentzündung nicht ausgeschlossen.

1. 9. 31 Nachuntersuchung. Urin sauer, frei von Eiweiß, Zucker und krankhaften Formbestandteilen. Blasenkapazität 200 ccm. Leichte Behinderung des linken Beines. Wirbelsäule in Form und Bewegung normal.

20. 7. 32 starke Druckschmerzhaftigkeit der rechten Nierengegend. Urin sauer, trüb, mit nachweisbarem Eiweiß. Im Sediment zahlreiche Leucocyten.

11. 8. 33 Urin trüb mit Flocken, ohne Eiweiß und Leucocyten, mit spärlichen Erythrocyten.

8. 11. 33 Blasenpiegelung mit Harnleiterkatheterismus: Leichter Blasenkatarrh mit entzündlicher Rötung beider Harnleitermündungen. Indigocarmin links nach 4 Minuten in kräftigem Strahl ausgeschieden, rechts bis 10 Minuten keine Ausscheidung. Im linken trüben Nierenurin erhebliche Zahl von Leucocyten; rechts Hindernis in 15 cm Höhe, keine Urinentleerung rechts trotz Flüssigkeitseinspritzung durch den Katheter. Auf der Leeraufnahme ein Schatten in Höhe der Beckenumrandung neben dem Kreuz-Darmbeingelenk.

30. 12. 33 intravenöses Pyelogramm: Links normales Nierenbecken, rechts keine Nierenbeckendarstellung. Retrogrades Pyelogramm zeigt linkes Nierenbecken von normaler Gestalt und Füllung, rechts ein Hindernis in 12 cm Höhe, Kontrastflüssigkeit dringt nur bis zu dieser Stelle, dem Schatten auf der Leeraufnahme vor, nicht darüber hinaus.

Auf Grund dieser Feststellung wird vollständige Funktionseinstellung der rechten Niere infolge Harnleiterverschlusses angenommen. Der Harnleiterverschluß wird mit Wahrscheinlichkeit auf gleichzeitige Quetschung desselben mit nachfolgender narbiger Verengung zurückgeführt, während eine entzündliche Verengung infolge langdauernder Harnleiterentzündung für weniger wahrscheinlich gehalten wird. Die Fieberanfälle werden auf eine durch den Harnleiterverschluß hervorgerufene infizierte Hydro-nephrose zurückgeführt.

Zur Klärung der Frage, ob es sich bei dem Schatten in der Gegend des Harnleiters etwa um einen Stein handelt, Aufnahme ins Johanniter-Krankenhaus am 29. 1. 34. Blutdruck R.R. 105/70 mm Hg. Cystoskopisch zeigt sich Blafeneingang gerötet, ebenso die rechte Harnleitermündung, linke regelrecht. Aus dem linken Harnleiter entleert sich in regelrechten Zwischenräumen klarer Urin, aus dem rechten Harnleiter ab und zu getrübtter Harnstrahl. Indigocarmin links nach 5 Minuten; rechts keine Ausscheidung bis 12 Minuten. Der nach Einführung des Harnleiterkatheters abtropfende linksseitige Nierenurin nach Harnstoffbelastung $17,5^{1/100}$ Harnstoff. Harnleiterkatheter läßt sich rechts mühelos vorschieben bis ins Nierenbecken, dabei kein Widerstand. Rechter Nierenurin dünn, stark durch Eiterbeimengung getrübt. Harnstoffgehalt $3,75^{0/100}$. Im rechten Nierenurin massenhaft Eiterkörperchen, spärliche Erythrocyten und Coccen, vereinzelte Zylinder. Blutharnstoff nüchtern $0,10^{0/100}$, 24 Stunden nach Harnstoffbelastung $0,20^{0/100}$.

Im intravenösen Urogramm rechter Nierenschatten nicht deutlich sichtbar, Nierenbecken angedeutet, Harnleiter nicht dargestellt. Im retrograden Pyelogramm rechtes Nierenbecken und Kelche gegen links etwas erweitert, desgleichen auch der obere Teil des Harnleiters, der sich in Höhe des Querfortsatzes des 4. Lendenwirbels mäßig verengt, um dann peripher in ampullenartiger Erweiterung in Höhe des 5. Lendenwirbels überzugehen; von da Harnleiter nicht mehr erweitert. Der Harnleiterkatheter verläuft im Röntgenbild nach innen von dem erwähnten Schatten.

Dieser Schatten ist mithin kein Stein, sondern entspricht einer unregelmäßigen Knochenstruktur im Darmbein. Kein narbiger Verschluß des rechten Harnleiters, wahrscheinlich infolge gelegentlich starker Schwellung der Harnleiterschleimhaut vorübergehender Harnleiterverschluß.

Da die rechte Niere schwer erkrankt ist, infiziert, und für Ru. wegen Möglichkeit einer Infektion der linken Niere sogar gefährlich, wird die

rechte Niere am 11. 6. 34 exstirpiert, nach Feststellung der guten Funktionstüchtigkeit der gefunden linken Niere bei mäßigen Eiweißmengen, fehlendem Bakteriengehalt des Urins und Harnstoffgehalt von $26,5^{0/100}$ nach Harnstoffbelastung.

Fettkapsel der Niere mit dieser verwachsen. An der Niere angeborene Anomalie in Form von drei Gefäßstielen, Exstirpation der Niere, Verschluß der Wunde bis auf ein eingeführtes Drain. Entfernte Niere 7 cm lang und 3,5 cm breit, also stark geschrumpft. Auf dem Nierenquerschnitt Kelche erweitert, Schleimhaut des Nierenbeckens und der Kelche verdickt und gerötet. Mikroskopisch das Bild einer chronischen, ascendierenden Pyelonephritis (hochgradige Schrumpfung, hyaline Entartung der Glomeruli und eigentümliche knötchenförmige Zellinfiltration). Nach der Operation Abfall der früher erhöhten Temperatur bei starker, langdauernder Wundabsonderung. Urinausscheidung vom ersten Tage günstig, erreichte schon nach einer Woche normale Werte. Blutharnstoff $0,25^{0/100}$, so daß mit eiweißreicherer Diät begonnen werden konnte. Auch bei besonderer Harnstoffbelastung wurde die physiologische Höchstgrenze nicht erreicht. Bei Kochsalzzugabe von 4 Gramm Defizit von 1,3 Gramm. Konzentrations- und Verdünnungsversuch ergibt noch eine mäßige Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit und etwas verzögerter Flüssigkeitsausscheidung. Da die zurückgelassene Niere erst in Monaten vollständig zu ihrer Leistung sich den veränderten Verhältnissen anpaßt, war die eingehende Prüfung der Nierenfunktion eine zufriedenstellende.

13. 11. 34. Bei der Nachuntersuchung hatte die linke Niere die Arbeit zweier Nieren bereits einwandfrei übernommen. Blutdruck R.R. 115/78 mm Hg. Urin frei von krankhaften Formbestandteilen. Urinausscheidung schwankt während der Beobachtung zwischen 1000 und 1450 ccm, spez. Gewicht zwischen 1011 und 1023 außerhalb des Konzentrations- und Verdünnungsversuches. Blutharnstoff nüchtern $0,215^{0/100}$, 24 Stunden nach Harnstoffbelastung $0,286^{0/100}$. Neigung zur Retention stickstoffhaltiger Substanzen besteht nicht. Nach Erreichung des Kochsalz-Gleichgewichtes 4 Gramm Zulage restlos innerhalb 24 Stunden ausgeschieden. Der Konzentrations- und Verdünnungsversuch mußte am Tage nach der Harnstoffbelastung vorgenommen werden, zu einer Zeit, als die diuretische Wirkung der verabreichten Harnstoffmenge noch nicht völlig abgeklungen war. Darauf war es zurückzuführen, daß das spez. Gewicht zu Beginn des Versuches 1010 betrug, während das höchste spez. Gewicht außerhalb der Harnstoffbelastung 1023 erreichte, ebenso die überschießende Ausscheidung innerhalb 24 Stunden (1295 ccm nach dem Einführen von 1000 ccm Flüssigkeit).

Vom 21. bis 24. 5. 35 bei der Prüfung der einzelnen Teilfunktionen der Niere vollständig normale Verhältnisse. Urin stets frei von krank-

haften Formbestandteilen; niemals Zylinder, Nierenzellen oder Bakterien.

Vom 22. bis 24. 9. 36 Nachuntersuchung. Urinentleerung in gutem Strahl. Urin sauer, frei von Eiweiß und Zucker. Im Sediment vereinzelte Stäbchen und Blase deckzellen. Nach $8\frac{1}{2}$ Minuten Ausscheidung von Indigocarmin. Im Konzentrationsversuch steigt das spez. Gewicht auf 1020. Beim Verdünnungsversuch spez. Gewicht von 1003.

Bei Ru. handelte es sich um mehrfachen Bruch der linken Schambeinäste mit vollständigem Abriß der Harnröhre nahe der Blase. Schon im Verlauf der Operationsnachbehandlung kam es zu rechtsseitiger Nierenbeckenentzündung, die in der Folge sich zur chronischen Pyelonephritis entwickelte und die Exstirpation der rechten Niere notwendig machte.

Während dieser Zeit wurde die Ursache der Nierenerkrankung in der narbigen Verengerung des Harnleiters und in einem Stein im Anfangsteil des Harnleiters vermutet. Es bestand aber, wie Prof. Bunge feststellte, weder ein narbiger Verschluss, noch handelte es sich bei der Schattenbildung auf der Leeraufnahme um einen Harnleiterstein, vielmehr kam es zum vorübergehenden Harnleiterverschluss durch die gelegentlich starke Harnleiterschleimhautschwellung, fortgeleitet von der Nierenbeckenentzündung.

Da durch die verschiedenen Prüfungen eine gute Funktionstüchtigkeit der linken Niere festgestellt wurde, konnte Ru. von der drohenden Gefahr einer Infektion der linken Niere mit ihren Folgen durch Exstirpation der kranken, rechten Niere bewahrt werden.

Schon nach 5 Monaten ergab die Nachuntersuchung, daß die linke Niere die Funktion beider Nieren bereits vollständig übernommen hatte, selbst bei stärkerer Belastung.

II. K. Sp., Schlepper, 23 Jahre, Unfallstag: 29. 6. 28.

Zwischen zwei Wagen gepreßt. Sofort wegen Schmerzen im Unterleib ins Krankenhaus. Aufnahmebefund: Druckschmerzhaftigkeit des Kreuzbeins und der Schambeine. Wasserlassen unmöglich. Entleerung der Blase mittels Katheter gelang nicht. Beim Einführen Gefühl, als ob Katheter stecken blieb, wobei sich dunkles Blut entleerte. Im Röntgenbild Lockerung des Kreuz-Darmbeingelenkes links mit Bruch des linken aufsteigenden und queren Schambeinaftes.

Sofortige Operation. Bluterguß und Nachblutung aus dem Blasenraum. Blase mit stark blutigem Urin gefüllt, Blut fließt rückläufig durch den Blasenschließmuskel von der Abrißstelle kurz vor dem Blaseingang. Durch retrograden Katheterismus von der Blase her Vereinigung der beiden abgerissenen Stücke.

31. 8. 28 Weglassen des Dauerkatheters. An der Tamponstelle sich bildende Dammfistel heilt ab. Harnröhrenverengung durch Bougieren behandelt.

20. 10. 28 Entlassung. Zeitweise unwillkürlicher Harnabgang. In ambulanter Behandlung Bougierung.

Seit Januar 32 ohne Rente.

33 Bougiebehandlung.

24. 4. 36 Harnröhrenlichtung durch narbige Verengung im hinteren Abschnitt verengt. Katheter Charr. 10 bis 20 kann ohne weiteres eingeführt werden.

26. 9. 36 Aufnahme ins Johanniter-Krankenhaus. Harnröhre für Bougie Charr. 16 nicht durchgängig. Einführung von Bougie Charr. 12 und Seidengespinnstbougie von gleichem Kaliber gelang noch soeben nach Überwindung eines buckelförmigen Vorsprungs. Nach spontaner Entleerung von 10 ccm wurden noch 450 ccm Resturin entleert.

Wegen schwerer Störung der Blasenentleerung mit Gefahr der Rückstauung des Urins in die Nierenbecken mit ihren Folgeerscheinungen wird zur Operation geraten, da von einer Bougiekur nur vorübergehend gute Resultate zu erreichen sind.

Indigocarmin intravenös entleert sich durch Katheter nach $3\frac{1}{2}$ Minuten. Röntgenbild nach Kontrastmitteleinspritzung zeigt gute Füllung des vorderen Teils der Harnröhre, hinterer Teil bis zur Blase nur schwach gefüllt, anscheinend lange röhrenförmige Striktur.

3. 11. 36 Operationsbefund bei Boutonnière ergab umschriebene, ringförmige, irisblendenartige Striktur, nicht, wie nach dem Röntgenbild angenommen werden mußte, lange röhrenförmige Harnröhrenverengung. Freilegung und Spaltung. Leichtes Einführen von Katheter Charr. 24. Beschwerdefrei entlassen.

Zur Vorbeugung einer erneuten Verengung erlernt Sp. unter ärztlicher Aufsicht durch systematische Bougierung mit Bougie Charr. 23 gewonnenes Resultat halten.

12. F. Th., Hauer, 32 Jahre, Unfallstag: 20. 12. 24.

Durch plötzlichen Stein- und Kohlefall aus dem Hangenden Verletzung im Rücken und in der linken Seite. Im Krankenhaus zu Bardenberg folgender Befund: Puls des leicht Schockierten 120, regelmäßig und mittelkräftig. Leib unterhalb des Nabels angespannt und druckschmerzhaft. Zu beiden Seiten der Lendenwirbelsäule und in der linken Kreuz-

beingegend starker Bluterguß und Druckschmerzhaftigkeit. Starke Quetschung oberhalb der linken Gefäßhälfte. Rechtes Bein schlechter aktiv beweglich als das linke. Spontanes Urinieren nicht möglich. Daher Dauerkatheter. Urin klar, frei von Eiweiß und Blut. Dauerkatheter wird zeitweise entfernt. Besonders beim Husten unwillkürlich Urinabgang. Flache Lagerung im Bett. In den Tagen nach dem Unfall Blutergüsse über Lendenwirbelsäule und Kreuzbein noch stärker.

31. 12. 34 im Röntgenbild: Ausgedehnte Zertrümmerung der rechten und linken Kreuzbeinhälfte, Lockerung in den Kreuzdarmbeingelenken, Bruch des 1., 2., 3., 4., 5. linken und 2., 3., 4., 5. rechten Lendenquerfortsatzes, Bruch des linken unteren Schambeinaastes und der linken Beckenschaukel.

Da im Gipsbett Druckstellen auftreten, Verlegung ins Dauerbad. Zeitweise neuralgische Schmerzen im ganzen rechten Bein bis in den Fuß. Im Dauerbad vollkommene Entleerung der Blase mit der Bauchpresse und unter Zuhilfenahme der Hände durch Druck auf die Blasenegend. Bei Überfüllung der Blase geht der Urin unwillkürlich ab.

1. 4. 35 lernte Th. zunächst mit Laufwagen, dann an Krücken und zuletzt mit Stöcken laufen.

3. 8. 35 Entlassung in ambulante Behandlung. Bauchmuskulatur sehr schlaff. Beim Pressen wölben sich in beiden Leisten über taustgroße Wülste vor. Über der oberen linken Gefäßhälfte mit feiner Haut bedeckte, handtellergroße Narbe. Die Lendenwirbelsäule zeigt eine leichte Linkskoliole mit Klopfschmerzhaftigkeit und Bewegungseinschränkung nach vorn und hinten. Rechts Beckenhochstand. Stehen auf dem linken bzw. rechten Bein schlecht möglich. Gang ohne Stock langsam, dabei wird das rechte Bein nachgeschleift. Afterrosette teilweise verstrichen. Beim Auseinanderziehen der Gefäßhälften klappt die Afteröffnung. Einführen des Fingers gelingt ohne Widerstand; Darm voll Stuhl. Einführen eines Katheters Charr. 21 in die Blase geht ohne Widerstand, wird nicht empfunden. Blase stark gefüllt. Urin trüb, wenig Eiweiß und reichlich Leucocyten. Berühren der Geschlechtsorgane wird nicht empfunden. Hoden klein. Seit dem Unfall keine Erektion. Es besteht Reithosenanästhesie.

Vom 3. bis 8. 2. 36 zwecks Beobachtung im Johanniter-Krankenhaus. Blutdruck R.R. 135/70 mm Hg. In beiden Leistengegenden wölben sich bei Gebrauch der Bauchpresse die Bauchdecken in Handbreite wulstartig vor, während die Mitte des Bauches im Bereich der geraden Bauchmuskeln eingezogen bleibt. Dadurch Dreilappung des Bauches (ventre a trilobues). Reflexe der oberen Bauchdecke gut, die der unteren schwach auslösbar. Cremasterreflex beiderseits deutlich. Knieflehenreflex rechts gesteigert, links lebhaft. Achillessehnenreflex links gut auslösbar, rechts angedeutet. Reithosenanästhesie. An der rechten Außenseite des Oberschenkels bis zur

Beugeseite an der Achillessehne Empfindung für spitz und stumpf aufgehoben. Einführen eines Bougie Charr. 25 in die Harnröhre fällt geradezu in die Blase hinein. Dabei gibt Th. an, nicht das geringste Empfinden zu haben. Beim Aufrichten in liegender Stellung wird unwillkürlich Urin und Stuhl entleert. Reaktion des Urins sauer, starker Eiweißgehalt von 3,5^{0/100} nach Esbach. Im Sediment massenhaft Leucocyten, Erythrocyten in mäßiger Zahl und Coccen in wechselnder Menge.

Vom 22. 2. bis 30. 4. 36 zwecks Behandlung im Johanniter-Krankenhaus. Die Blasen Spiegelung ergab: Blasen Schleimhaut stark gewulstet und gerötet bei leidlich erhaltener Gefäßzeichnung. Das Schramm'sche Zeichen eben angedeutet. Indigocarmin rechts nach 4 Minuten ausgeschieden, links nach Ablauf von 6 Minuten Blauauscheidung nicht beobachtet. Die in die Harnleitermündungen eingeführten Katheter knicken 2 cm oberhalb der Harnleitermündung ab, lassen sich nur noch 1 cm weiter vorschieben infolge des abnormen Verlaufs der Harnleiter.

28. 2. 36 mit Rücksicht auf die gestörte Blauauscheidung aus der linken Niere röntgenologische Untersuchung. Rechte Niere o. B. Linker Nierenschatten vergrößert, Nierenbecken etwas erweitert, Nierenkelche mäßig stark gefüllt, reichen im oberen Teil bis fast zur Begrenzung des vergrößerten Nierenschattens. Linker Harnleiter etwas nach der Lendenwirbelsäule zu verlagert.

Wegen des schweren eitrigen Blasenkatarrhs und der Nierenerkrankung bestand die Behandlung in strenger Bettruhe, Nierendiät und Blasen- einträufelungen mit entsprechenden Mitteln. Th. wurde durch die diätische Behandlung sehr mitgenommen, besonders durch die Kochsalzentziehung. Durch Verordnung des kochsalzfreien Tritosalzes gelang es, ihm über seinen Depressionszustand wegzuhelfen. Um die Infektion der Harnwege noch wirkfamer bekämpfen zu können, wurde eine Vaccinekur (*bacterium coli commune*) begonnen.

Die vor der Entlassung ausgeführte Urinuntersuchung ergab, daß die Eiweißmenge so gering war, daß sie nach Esbach nicht mehr quantitativ bestimmbar war. Er erhielt Urinal und Gummihohe, wodurch er sich weniger belästigt und freier fühlt.

In diesem Falle handelt es sich nicht um eine direkte Schädigung der Blase und der Harnröhre durch den Becken- und Kreuzbeinbruch, sondern um eine schwere Störung der Innervation der Blase. Die aus dem Kreuzbein austretenden Nerven sind fast in voller Ausdehnung gelähmt. Es besteht eine Gefühls lähmung in Form der Reithosenanästhesie. Die Gefühlsstörung auf der Außenseite des rechten Ober- und Unterschenkels erklärt sich ebenfalls durch Schädigung zweier Kreuzbeinnerven, die dieses Gebiet versorgen. Besonders sinn-

fällig ist der Befund von der Lähmung eines Teiles der breiten Bauchmuskeln. Bei Th. ist dieser dreilappige Bauch Folge einer Nervenlähmung und zwar des Iliohypogastricus und des Ilioinguinalis, deren Schädigung wahrscheinlich durch Verlagerung der Lendenwirbelquerfortsätze erfolgt ist. Bei der Gangstörung wirken verschiedene Momente mit: Innervation der Bauchmuskeln, Verletzung des Kreuzbeins und Kreuzdarmbeingefüges, in untergeordnetem Maße auch die Gefühlsstörung des rechten Beines.

Infolge der Lähmung des unteren Mastdarms einschließlich des Schließmuskels ist die Stuhlentleerung aufs schwerste gestört. Th. muß den Stuhl zum Teil mit dem Finger ausräumen, teilweise geht der Stuhl unfreiwillig ab. Beim Aufrichten und Husten entleert Th. in großem Strahl unfreiwillig Urin. Als Folge der Blasenlähmung besteht jetzt ein hochgradiger, eitriger Blasenkatarrh. Der hohe Eiweißgehalt des Urins mit $3,5^{0/00}$ weist darauf hin, daß bereits die Nieren in erheblichem Grade an der Erkrankung beteiligt sind, wie auch die funktionelle Schädigung der linken Niere, die verzögerte Blauausscheidung und das damit in Einklang stehende Röntgenbild (Stauung mit beginnender Hydronephrose) aufzeigt. Die schwere toxische Nierenschädigung ist durch die eingeleitete Vaccinekur bei der Entlassung beseitigt.

Die Prognose muß mit großer Vorsicht gestellt werden, weitere Verschlimmerung ist wahrscheinlich.

Th. ist nur fähig zur Heimarbeit.

13. J. W., Schlepper, 19 Jahre, Unfalltag: 18. 4. 31.

Quetschung zwischen einen herankommenden, mit Kies beladenen Bergewagen und die Streckenmauer. Aufnahmebefund im Krankenhaus „Bethanien“ zu Mörs: Schwerer Zertrümmerungsbruch des Beckens mit Zerreißen der Blase und Abriß der Harnröhre an der Blase. Zur Wiederherstellung des Urinabflusses war sofortige Eröffnung der Blase und Einlegung eines Dauerkatheters durch die Harnröhre bis in die Blase erforderlich. Anfangs war der Zustand so, daß mit dem Tode gerechnet werden mußte. Heilung stark verzögert durch eine hartnäckige Urinfistel oberhalb der Schambeinfuge; ferner dadurch, daß sich im Verlauf von 6 Monaten im linken Harnleiter 3 Nierensteine festklemmten, die operativ entfernt werden mußten. Auch war zur Beseitigung der Urinfistel eine nochmalige Eröffnung der Blase und Wiederherstellung der Verbindung

der Harnröhre mit der Blase nötig gewesen. Durch alle diese Störungen hatte die Bettruhe lang ausgedehnt werden müssen. Es hatte sich eine Gehstörung herausgebildet, die zum allergrößten Teil als psychisch bedingt angesehen wurde. Deshalb energische Gehübungen. Erst 10 Monate nach dem Unfall konnte W. mit Krücken allein gehen. Die Urinfistel oberhalb der Schamfuge bildete sich wieder, nachdem sie monatelang geschlossen war.

9. 5. 32 Aufnahme ins Johanniter-Krankenhaus. Die vorgenommene Röntgenuntersuchung von Blase und Harnröhre ergab im Bereich der Schoßfuge eine Verengung von der Dicke einer Haarnadel. Das Ende dieser Verengung mündete in eine mit Kontrast gefüllte, kleine Höhle, oberhalb dieser Höhle war ein an der Blase hängender Rest der Harnröhre zu erkennen. Es handelte sich nicht um eine Blasenfistel, sondern um eine Fistel im Bereich der Harnröhrenverengung. Im linken Nierenbecken ein erbsengroßer, steinverdächtiger Schatten. Ein in die Harnröhre eingeführtes Bougie stößt unterhalb der Schamfuge auf ein Hindernis. Es gelang, einen dünnen Ureterkatheter durch die Verengung zu führen, der aus der Fistel oberhalb der Schoßfuge heraustrat. Der aus der suprapubischen Fistel sich entleerende Urin sauer, enthielt geringe Mengen Eiweiß; im Sediment reichlich Leucocyten und viele Coli-Bazillen.

27. 5. 32 Klagen über kolikartige Schmerzen in der linken Nierengegend. Bei einer Untersuchung war die Fistel fest verschlossen. Dieser vorübergehende Verschuß der Urinfistel machte, da auch durch die verengerte Harnröhre kein Urin abfloß, eine Operation notwendig. Die Fistel wurde operativ eröffnet, ein dünner Katheter eingeschoben, durch den reichlich Urin abfloß. Nachdem die durch Urinverhaltung aufgetretene Temperatursteigerung abgeklungen war, am 11. 6. 32 Operation durch Prof. Bunge.

Die Harnröhrenverengung wurde vom Damm aus freigelegt und, soweit es möglich war, gespalten. Da es vom Damm aus nicht gelang, die Verengung in voller Ausdehnung freizulegen, wurde die Blase durch Blasenschnitt eröffnet, und von der eröffneten Blase Bougies von zunehmender Stärke in die hintere Harnröhre, durch die vordere Harnröhre ein weiteres Bougie eingeführt. Beide Bougies stoßen in einem mit Urin gefüllten Hohlraum vor der Blase aufeinander. Es bestand also ein Defekt der Harnröhre an der Stelle der Verengung, der zu einem cysternenartigen Hohlraum zwischen Harnröhrenverengung und Schoßfuge geführt hatte. Durch die nunmehr erweiterte Harnröhre wird eine Nelaton-Katheter von der Höhle aus in die Blase eingeführt. Nachdem so der Harnröhrendefekt durch den Katheter überbrückt war, wurde die Dammwunde vernäht. Eine Vernähung der Harnröhrenstümpfe hatte sich als nicht durchführbar erwiesen. Die über dem Katheter sich neu bildende Harnröhre wird mit elastischen Bougies aufsteigend bis Charr. 20 bougiert.

W. lernt es allmählich selbst die Bougies einzuführen. Durch den Dauerkatheter war nach der Operation die Blasenentleerung auf natürlichem Wege möglich. Im Verlauf der Heilung eine leichte Nebenhodenentzündung, die bald zurückging. Nach Weglassen des Dauerkatheters mußte W. ein Urinal tragen, da die Blase schlußunfähig war, wie beim Eintritt in die Behandlung.

17. 8. 32 Entlassung. Im Röntgenübersichtsbild ein nicht fest knöchern verheilter Beckenbruch; Schoßfuge schräg gestellt und klaffend; ebenso klafft die Kreuzbeinfuge etwas. Die linke Beckenhälfte läßt sich nach oben verschieben. Der Gang mit Krücken erfolgt unsicher, ataktisch-paretisch. Diese Gangstörung beruht auf einer Einwärtsbiegung der Deckenschaufel. Die Knochenfragmente der Scham- und Sitzbeine haben sich von rechts nach links übereinandergeschoben und so die Ansatzstelle der Muskeln stärker einander genähert. Eine wirkliche Zusammenziehung ist daher nicht mehr möglich. Auf diese Weise läßt sich die nachweisbare Iliopsoaschwäche erklären.

Vom 27. 12. 32 bis zum 17. 1. 33 wurde er in Mörs wegen Neigung zur Wiederverengerung der Harnröhre behandelt.

Bis zur erneuten Krankenhausaufnahme am 27. 3. 33 traten öfters linksseitige Nierenschmerzen auf. Ein Stein war im Röntgenbild nicht zu sehen. Der Gang mit einem Stützapparat hat sich gebessert, ist aber noch immer ungeschickt und unsicher. Der Versuch, den Katheter für länger als eine halbe Stunde wegzulassen, macht große Schwierigkeiten. Neigung zur Verengerung der Harnröhre.

30. 10. 33. W. trägt noch immer Beckengürtel und die beiderseitigen Beinprothesen, obwohl das Becken fest verheilt ist.

18. 3. 34 Schmerzhaftigkeit des linken Hodens und starke Rötung, Schwellung, Vorwölbung und deutliche Fluktuation in der Operationswunde links, oberhalb der Leistenbeuge. Bei der Incision quoll schmieriger Eiter aus der Wunde.

5. 4. 35 bestand die noch immer erheblich eiternde Fistel. Der Gang ohne Stützapparat ziemlich flott.

23. 8. 35 infolge des Dauerkatheters Nebenhodenentzündung. In der linken Unterbauchgegend fecernierte noch die eiternde Fistel. Durch die langen eitrigen Absonderungen ging der Gesamtzustand zurück. Die Nierenkoliken nahmen zu.

16. 12. 35 bei der Krankenhausaufnahme Temperatur von $39,5^{\circ}$. Fistel entzündlich gerötet, sondert aus großer Tiefe dicken, gelben Eiter ab. Rechter Nebenhoden stark geschwollen, äußerst druckschmerzhaft. Leistendrüsen vergrößert und schmerzhaft. Es handelte sich um eine rechte, akute Nebenhodenentzündung mit Eiterverhaltung der Fistel in der linken Leistenbeuge.

Bei einer Leeraufnahme zeigte sich im Verlauf des linken Harnleiters in Höhe des 4. und 5. Lendenwirbels ein haselnußgroßer Stein. Die linke Harnleitermündung gerötet, starr und ohne Funktion. Indigocarmin nach 15 Minuten links nicht beobachtet. Auch aus der Fistel in der linken Leistenbeuge trat kein blauer Farbstoff aus. Bei der Harnleiterfondierung drang man links nur 12 cm hoch ein. Die Fistel in der Leistenbeuge wurde 10 cm schräg in die Tiefe sondiert. Links drang eingespritztes Kontrastmittel in dünnem Strahl an dem Stein vorbei ins Nierenbecken, wo sich aber weder Becken noch Kelche füllten. Ein Teil des Kontrastmittels fand sich an der Spitze der in die Fistel eingeführten Sonde. Eine intravenöse Pyelographie hatte keinerlei Füllung der linken Harnwege ergeben. Es handelte sich also um eine durch den großen Harnleiterstein bedingte Fistel des linken Harnleiters mit pyelonephritischen Zerstörungen der linken Niere.

Bei der am 2. 2. 36 in epiduraler Leitungsanästhesie vorgenommenen Operation wurde die linke Niere samt dem Harnleiter breit freigelegt. Niere klein, geschrumpft, ihre Kapsel stark verwachsen. Da der Zugang nicht ausreichte, mußte die zwölfte Rippe reseziert werden. Danach wurde der Gefäßstiel der linken Niere unterbunden und die Niere am Harnleiter entwickelt. An der Stelle, wo der Stein lag und die Harnfistel bestand, riß der Harnleiter ab und wurde samt der Niere und dem großen Harnleiterstein entfernt, der Harnleiterstumpf blasenwärts unterbunden und die Wunde unter Drainage schichtweise verschlossen.

Die erste Woche verlief ohne wesentliches Fieber, aber unter starker Beschleunigung des Pulses, der dann wieder normale Werte erreichte. Die Ausscheidung der verbliebenen rechten Niere stieg bald auf normale Werte an und glich sich allmählich der Flüssigkeitsaufnahme vollständig an. Die Operationswunden verheilten bis auf die 3 Drainstellen, die allmählich zugranulierten, glatt. Ferner gelang es, den Verletzten des Dauerkatheters zu entwöhnen, der ein ständiger Infektionsherd bildete. Da eine völlige Blasenlähmung besteht, trägt er jetzt wieder sein Urinal. Das Körpergewicht stieg um 6 kg an. Zur Heilung der ebenfalls chronisch entzündeten rechten Niere wurde jetzt eine Wildunger-Kur durchgeführt. Daneben geht die Behandlung mit Massage, Heißluft und Elektrifizieren der unteren Gliedmaße und der Kreuzgegend.

Es hat sich bei W. um einen schweren Zertrümmerungsbruch des Beckens mit Zerreißung der Blase und Abreißung der Harnröhre von der Blase gehandelt. Es waren im Krankenhaus „Bethanien“ mehrfach operative Eingriffe an der Blase erforderlich, die zunächst zum Ziele führten; doch trat erneut oberhalb der Schamfuge eine dauernd urinabsondernde Fistel auf. 3 eingeklemmte Steine mußten operativ

aus dem linken Harnleiter entfernt werden. Es ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß diese 3 entfernten Harnleitersteine ursächlich auf den Unfall zurückzuführen sind, ebenso wie der durch Prof. B u n g e schon 1932 festgestellte und in der linken Niere nachgewiesene, steinverdächtige Schatten. Die langanhaltende Fistel-eiterung, verschiedene Hoden- und Nebenhodenentzündungen und die häufigen Nierenkoliken brachten W. in einen kläglichen Allgemeinzustand. Der später im linken Harnleiter beobachtete Stein, der die Ursache der pyelonephritischen Zerstörungen der linken Niere und der Fistelbildung war, wurde samt der Niere operativ entfernt, so daß in absehbarer Zeit das Heilverfahren abgeschlossen werden konnte.

Bemerkenswert an diesem Fall ist, daß nach der ersten Verletzung im Anschluß an die Verletzung durch Blasenschnitt und Einlegen eines Dauerkatheters ein Defekt im vorderen Teil der Harnröhre an der Verletzungsstelle übrig blieb, der zu einem cysternenartigen Hohlraum zwischen Harnröhre und Symphyse führte und zu einer Fistelbildung oberhalb der Symphyse. Diese Fistel hatten den erstbehandelnden Arzt zu der Annahme verleitet, daß eine Blasenfistel vorläge, deren operative Beseitigung ihm nicht gelang. Erst durch Prof. B u n g e wurden die Verhältnisse geklärt, Abhilfe geschaffen, so daß nach entsprechender weiterer Behandlung auf Dauerkatheter und weiteres Bougieren verzichtet werden konnte. Nach Entfernung der infizierten, funktionstüchtigen, geschrumpften, linken Niere samt des inzwischen entstandenen, eingeklemmten Uretersteins und durch Tragen eines Urinals wurde ein erträglicher Zustand für den Verletzten geschaffen.

Es ist wahrscheinlich, daß die von H a n s e n erwähnten Divertikelbildungen an der Harnröhre auf ähnliche Defektbildung im Bereich der Harnröhrenverletzung bzw. Verengerung zurückzuführen sind.

14. P. Wa., Schlepper, 23 Jahre, Unfalltag: 7. 3. 05.

Von zurückrollendem, beladenen Wagen gegen entgleisten Wagen gepreßt. Aufnahmebefund im Lazarett Neunkirchen. Gehen unmöglich. Leib aufgetrieben, Bauchdecken stark gespannt. Breite Dämpfung vom Unter-

bauch zur linken Flanke hin, Betaften schmerzhaft. Stauchung des Beckens schmerzhaft. Tropfenweise Blutentleerung aus der Harnröhre. Durch Katheter Entleerung stark blutigen Urins. Singultus.

Wegen Verdacht auf Blasenruptur Operation. Nach Incision oberhalb der Symphyse sofortige Entleerung großer Mengen blutvermischten Urins. Von diesem Einschnitt aus konnte ein Bruch des rechten horizontalen Schambeinastes abgetastet werden. Blasenriß rechts dicht am Blasenhals (Abriß der Harnröhre). Naht derselben nicht möglich, daher Tamponade. Einlegen eines Dauerkatheters. In den nächsten Tagen bedrohlicher Zustand. Urinentleerung in geringer Menge durch den Katheter, Hauptmenge aus der Bauchwunde. Nach Incision eines Abszesses rechts von der Gliedwurzel, Bildung einer zweiten Blasenfistel. Allmähliche Heilung beider Fisteln. Da sich Beschwerden beim Harnlassen einstellten (starkes Pressen und Entleerung in nur dünnem Strahl), gelang es nach zuerst vergeblichen Versuchen die Harnröhrenverengung so weit zu dehnen, daß Bougie Charr. 24 ohne Schwierigkeit eingeführt werden kann. Beim Einführen der Bougie kurz vor dem Eintritt in die Blase eine Anzahl fester, leicht blutender Schwielen.

28. 10. 05 Entlassung. Urinentleerung in dickem, kräftigem Strahl. Urin klar, frei von Eiweiß. Wegen der durch die Verletzung verringerten Kapazität der Blase muß Wa. alle 1 bis 1½ Stunden Wasser lassen. Zweimal wöchentlich Bougierung.

3. 5. 06 Einführen von Bougie Charr. 24 nur mit Mühe unter leichter Blutung durch die enger gewordene Narbenstriktur kurz vor dem Blafeneingang.

27. 1. 07 Harn wird flott in dickem Strahl gelassen, klar, ohne Niederschläge. Fassungsvermögen der Blase gestiegen. Nicht mehr bougiert.

12. 3. 09 schon bei geringem Füllungsgrad der Blase Klagen über Brennen und starkes Druckgefühl. Nach großen Anstrengungen Wasserlassen erst nach einigem Zuwarten möglich. Striktur mit klappenförmiger Beschaffenheit, 15—16 cm hinter dem Orificium externum, wird mit elastischen Bougies Charr. 9—11 eben überwunden. In mittelmäßig dickem, gewundenem Strahl wird klarer Urin gelassen.

27. 6. 09 elastische Bougies von 2 mm Dicke passieren glatt, ohne Blutung, die narbige Verengung. Wasserlassen sofort ohne Störung in kräftigem nach rechts gedrehtem Strahl. Urin klar, kann 5 Stunden gehalten werden.

Vom 4. 10. bis 3. 12. 09 wegen Blasenkatarrhs in Lazarettbehandlung. Temperatur bis 38,6°. Harn sehr trübe, blutig gefärbt, leichte Eiweißtrübung. Bei der Entlassung Blasenkatarrh beseitigt, Harnröhre für Bougie Charr. 24 durchgängig.

Vom 1. 8. bis 30. 8. 12 und vom 15. 1. bis 8. 3. 13 erneut wegen Blasenkatarrhs und Strikturbeschwerden in stationärer Behandlung. Urin sehr trüb, entleert sich in dünnem geteiltem und gewundenem Strahl. In dem reichlichen Sediment zahlreiche Leucocyten, Bakterien, Blasenepithelien und Sargdeckelkristalle. Bougierung der Harnröhre macht zuerst große Schwierigkeit wegen Taschenbildung in der Harnröhre, Blutung und Temperaturen von 40°. Später gelang Einführung bis zur stärksten Bougienummer. Bei der Entlassung Urin klar, ohne Eiweiß. Urinstrahl dick. Allgemeinzustand gebessert.

11. 4. 13 Untersuchung. Urin wieder trüb mit zahlreichen Bakterien und einzelnen Leucocyten. Beim Bougieren muß von Bougie Charr. 22 stärkerer Widerstand überwunden werden.

Bis 1918 abwechselnd Besserung und Verschlimmerung des Blasenkatarrhs mit Blafenschwäche.

Bis 1925 traten Strikturbeschwerden mehr in den Vordergrund.

17. 3. 25 neuralgische Schmerzen in der Leistenbeuge, wahrscheinlich durch den chronischen Entzündungszustand der Blase und Harnröhre hervorgerufen. Nach der monatlichen Bougierung, die immer schwieriger wird, treten geringe Blutspuren aus der Harnröhre auf, ein Zeichen, daß frische Verwachsungen an der ursprünglichen Verletzungsstelle der Harnröhre auseinandergerissen werden. Verschiedentlich auch starke Krampfzustände des Blafenschließmuskels, die bisweilen derartige Schmerzen verursachen, daß heiße Bäder und Morphinum nötig wurden.

Vom 26. 6. bis 24. 7. 26 stationäre Behandlung. Da mehrere Monate mit der Bougierung ausgesetzt wurde, war inzwischen die Striktur dermaßen stark geworden, daß eine Behandlung in den ersten Tagen nur mit allerfeinsten Bougies gelang. Stündliche Urinentleerung. Durch Nachträufeln dauernde Beschmutzung der Wäsche. Im Urin Leucocyten, Staphylococci und Streptococci. Bei der Entlassung Harnröhre für Bougie Charr. 21 durchgängig.

11. 8. 28 wegen starker Blutung und falschen Weges Aufnahme ins Knappschafftskrankenhaus. Harnröhre wieder für Charr. 24 durchgängig. Tragen eines Urinals notwendig.

6. 9. 29 Wasserlassen stündlich; außerdem unwillkürlicher tropfenweiser Abgang von Urin. Urin trüb mit Eiweiß, rötlich, von neutraler Reaktion. Im Sediment Leucocyten, Erythrocyten, Staphylococci und Blasenepithelien. Bougierung bis Charr. 22 ohne stärkere Blutung. Sonstige Beschwerden unverändert.

11. 12. 31 Aufnahme ins Johanniter-Krankenhaus. Blutdruck R.R. 160/100 mm Hg. An der rechten Hodenfachhälfte findet sich eine haarfeine Fistel mit entzündlich gerötetem, eingezogenem Hof. Beim Pressen tropfenweise Entleerung von urinöser Flüssigkeit. Mit Bougie Charr. 16

Überwindung einer harten, verengerten Stelle unter der Schoßfuge, wenige Zentimeter weiter ein selbst für filiforme Bougies unüberwindbares Hindernis. Urinträufeln. Im Urin Eiweiß in mäßiger Menge. Im Sediment zahlreiche Leucocyten, Blasedeckzellen und Coli-Bazillen.

Ein am 17. 5. 32 mit Kontrastmittel gefertigtes Röntgenbild ergab dicht unterhalb des oberen Randes der Schoßfuge Verengung am Übergang in die Blase. Aus diesem verengerten Teil der Harnröhre abzweigender Schatten nach der Richtung der Fistelöffnung. Auffüllung von der Hodensackfistel nicht möglich.

Einer operativen Beseitigung der Fistel entzieht sich der Patient durch Verlassen des Krankenhauses.

Weiterer Verlauf unbekannt.

Bei der Verletzung war es zu einem Bruch des rechten horizontalen Schambeinastes und zum Abriß der Harnröhre von der Blase gekommen. Nach Sectio alta Einlegen eines Dauerkatheters, daraufhin Weichteilinfektion mit Eiterung und Urinfistelbildung. Später Entwicklung eines starken Blasenkatarrhs und einer Striktur, deren Behandlung mit Bougierung wegen schmerzhafter Blutung große Schwierigkeiten machte; schließlich Bildung einer Urinfistel, die den ganzen Hodensack durchsetzt und aus der sich ein erheblicher Teil Urin entleert, Bildung zweier Strikturen, von denen die hintere für filiforme Bougies nicht durchgängig ist.

Operation der Striktur wäre aussichtsvoll gewesen, besonders da die Hodensackfistel nach Ausweis des Röntgenbildes ihren Ursprung vom verengerten Teil der Harnröhre nahm.

Aus den vorstehenden Krankengeschichten, die im Auszug zum Teil ausführlicher mitgeteilt werden mußten, gewinnt man ein Bild von den Spätfolgen bei Beckenbrüchen mit Verletzungen der Harnröhre und ihres Übergangs zur Blase.

Hieraus ergibt sich im einzelnen folgende Einteilung:

Gruppe A. Strikturen: a) Früh-Strikturen
b) Spät-Strikturen

Gruppe B. Infektion: a) Blase
b) Prostata
c) Niere

Gruppe C. Steinbildungen: a) Blase
b) paraurethral
c) Niere

Gruppe D. Fistelbildung: (Damm, Skrotum, Gefäßfalte, Blase, Unterbauchgegend)

Gruppe E. Inkontinenz.

Gruppe A. Strikturen.

a) Als Frühstrikturen werden hier Fälle aufgefaßt, bei denen die Striktur innerhalb zweier Jahre nach Abschluß der Behandlung auftritt.

In den meisten Fällen kam man mit konservativen Behandlungsmethoden nicht zum Ziel, öfters waren wiederholte Eingriffe zur Beseitigung der Striktur erforderlich. Prophylaktisch wurden alle Harnröhrenverletzte mit Ausnahme von Fall 4 teils in stationärer, teils in ambulanter Behandlung bougiert.

Fall 11. Sofort nach der operativen Erstversorgung der kurz vor dem Blaseneingang abgerissenen Harnröhre, trat die Neigung zur Schrumpfung auf. Sie machte ein jahrelanges Bougieren notwendig. 8 Jahre nach dem Unfall wurde die Striktur operativ angegangen, so daß eine dauernde ärztliche Behandlung in Wegfall kommt, nur noch gelegentlich ärztliche Kontrolle erforderlich ist.

Fall 4. Da eine Bougiebehandlung im Anschluß an die Operation nicht stattfand, mußte schon nach 8 Monaten eine erneute Operation wegen der mangelhaften Urinentleerung vorgenommen werden, die auf Jahre hinaus eine gute Wegsamkeit der Harnröhre brachte.

Fall 8. Trotz ambulanter Bougierung erreichte die infolge übermäßiger Callusbildung an der Beckenbruchstelle immer stärker werdende Harnröhrenverengung nach 2 $\frac{1}{2}$ Jahren einen solchen Grad, daß selbst allerfeinste Bougies nicht mehr den Weg in die Blase fanden. Operative Entfernung der Callusmassen brachte nur vorübergehende Besserung. Nach 18 Jahren mußte eine Blasenfistel angelegt werden, um die vorhandene Fistel, die sich zeitweise in der Operationsdammnarbe gebildet hatte, zu beeinflussen. Dadurch wurde die Harnröhre vollständig ausgeschaltet und im weiteren Verlauf völlig undurchgängig.

Fall 1. Sofort nach der kurzen Krankenhausbehandlung traten Strikturbeschwerden auf, die dauernd ärztliche Hilfe notwendig machten. Trotzdem er später 3mal zur Beseitigung der fast völlig obliterierten Harnröhre sich einer Operation unterzog, erfolgte die Urinentleerung teils in kraftlosem Strahl, teils tropfenweise. Späterhin Infektion der Nieren.

Nach operativer Entfernung der rechten Niere in auswärtigem Krankenhaus, exitus.

Fall 13. Schon im Verlauf der Operationsbehandlung war eine weitere Operation notwendig, um die Verbindung zwischen Harnröhre und Blase wieder herzustellen. 1 Jahr später schrumpfte die narbige Harnröhre, nachdem man kurze Zeit den Dauerkatheter weggelassen hatte, so, daß eine natürliche Harnentleerung nicht mehr möglich war. Trotz des zweimaligen Auftretens einer Hoden- und Nebenhodenentzündung war es erst nach 2 Jahren möglich, den Dauerkatheter zu entfernen, und der Neigung zur weiteren Verengung der Harnröhre durch systematisches Bougieren entgegenzuarbeiten.

Fall 9. Nach fortschreitender Verengung trotzte die nach 2 Jahren hochgradig gewordene, röhrenförmige Striktur einer weiteren Bougiebehandlung. Erst die operative Beseitigung der Harnröhrenverengung mit anschließender Bougierung sicherte für die Zukunft eine einwandfreie Blasenentleerung.

Fall 7. 7 Monate nach abschließender Behandlung wurde die Neigung zur Verengung festgestellt und einer Zunahme durch ambulante Bougierung gesteuert.

Fall 14. Nach der ersten operativen Verforgung (Abriß der Harnröhre an der Blase) stellte sich im Verlauf der nächsten Monate eine starke Verengung ein, die aber durch konservative Maßnahmen 18 Jahre lang einen guten Urinabfluß ermöglichte. Danach war die Harnröhre selbst für filiforme Bougies nicht mehr durchgängig. Der weitere Verlauf ist nicht bekannt.

Fall 5. Von Anfang an suchte man einer drohenden Strikturbildung entgegenzuarbeiten durch systematische Bougierung. Diese konservative Behandlung wurde oft erschwert durch Sequesterbildung im Bereich der hinteren Harnröhre. Oft war es nötig auf kleinste Bougienummern zurückzugreifen, um in die Blase zu gelangen. Später Dauerkatheter und Blasenfistel.

Fall 3. 10 Jahre lang war es möglich, durch schmerzhaftes Bougieren eine hinreichende Harnröhrenweite zu halten. Darauf aber mußte, da die Striktur nicht mehr dehnungsfähig war, operativ vorgegangen werden. Aber schon nach 4 Jahren war die Harnentleerung wieder derartig gestört, daß abermals chirurgische Maßnahmen erforderlich waren. Hierdurch konnte die starke Neigung zur Verengung aber auch nicht so beeinflusst werden, daß man mit dem Erfolg zufrieden sein konnte.

Fall 6. Sofort nach der operativen Erstverforgung Neigung zur Frühstriktur. Konservative Maßnahmen genügten, um die sich in mäßigen Grenzen haltende Striktur für mitteldicken Urinstrahl innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren durchgängig zu halten.

b) Hier handelt es sich um eine ausgesprochene Spätstriktur.

Fall 2. Nach 10 Jahren trat plötzlich Harnverhaltung ein durch eine starke Verengerung der Harnröhre. Ätiologische Mitbeteiligung einer etwaigen gonorrhöischen Infektion wurde von fachärztlicher Seite, Prof. E. Hoffmann, ausgeschlossen, so daß dieser Fall als echte Spätstriktur nach Harnröhrenverletzung bei gleichzeitigem Beckenbruch angesehen werden muß. Im Anschluß an die Operation wurde der bestehenden Neigung zur erneuten Verengerung entgegengearbeitet durch Bougierung, die wegen der Eigenart der Striktur unter kreisförmigen Bewegungen erfolgte.

Wie aus den angeführten Krankengeschichten zu ersehen ist, besteht bei allen Harnröhrenverletzungen mit Beckenbrüchen Neigung zur Strikturbildung, gleichgültig, ob konservative Behandlung nach der Verletzung oder operative Verforgung der Harnröhrenverletzung erfolgt ist.

Mit Ausnahme von 1 Fall, der als Spätstriktur auftrat, handelt es sich stets um Frühstrikturen innerhalb der ersten 2 Jahre.

In dieser Feststellung liegt die ernste Mahnung, allen Harnröhrenverletzungen bei Beckenfrakturen nach der Entlassung aus der Krankenhausbehandlung die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, sie dauernd unter ärztlicher Kontrolle zu halten, damit durch weitere entsprechende Behandlung Verschlimmerungen mit ihren Folgeerscheinungen vorgebeugt werden kann. Da die Erfahrung gezeigt hat, daß durch dauernd erforderliches Bougieren geradezu Neurastheniker herangezüchtet werden, so wird man in manchen Fällen um erneute operative Behandlung nicht herumkommen.

Als auffallende Feststellung muß noch vermerkt werden, daß primär genähte Harnröhrenverletzungen häufiger zu sekundären Verengerungen neigen, als die Fälle, die mit dem typischen äußeren Harnröhrenschnitt mit Heilung über einem möglichst dicken Harnröhrenkatheter behandelt worden sind.

Besonders ungünstig liegen die Verhältnisse bei totalem Abriß der Harnröhre von der Blase, was leicht verständlich ist.

Bei den Strikturen muß einer der häufigsten Begleiterscheinungen gedacht werden, der Urethritis. Es liegt in der Natur der Sache, daß durch die Harnröhrenverletzung eine Prädisposition für die Urethritis geschaffen wird. Dazu kommt noch, daß die notwendige

instrumentelle Behandlung dauernden Reiz setzt, der an für sich zur Urethritis Veranlassung geben kann, besonders dann, wenn bei mangelhafter Übung größere oder kleinere Verletzungen an den Strikturstellen beim Bougieren gesetzt werden.

Im Falle von Urethritis muß auch besonders auf Abzeßbildung, die davon ausgehen kann, geachtet werden.

Unter den eben angeführten Fällen konnte eine gleichzeitige Urethritis festgestellt werden sowohl klinisch als auch durch Harnröhrenspiegelung.

Fall 13. Hier kam es oberhalb der Leistenbeuge zu einem großen Abzeß, nach dessen Eröffnung noch lange Zeit eine erheblich eiternde Fistel zurückblieb.

Fall 6. Nach der operativen Erstversorgung noch vor Abschluß der Behandlung entstand in der linken Leistenfalte ein Abzeß und anschließend eine vorübergehende Fistel am Damm.

In einem vorstehend nicht aufgeführten Falle war es zu einer besonders schweren eitrigen Urethritis gekommen, die eine dauernde ärztliche Behandlung mit Spülung erforderlich machte. Zur Abzeßbildung ist es in diesem Falle nicht gekommen.

Daß aber auch die Urethritis Ursache der Prostatitis sein kann, beweist Fall 3.

Fall 3. Lange Jahre bestand ein stark eitriger Harnröhrenkatarrh, wie auch wiederholte Harnröhrenspiegelungen ergaben. Mehrmals kam es auch zur Abzeßbildung mit Notwendigkeit chirurgischer Behandlung. Durch die chronische Urethritis kam es auch zu einer starken Entzündung der Prostata und späteren Abszedierung wie durch Untersuchung vom Mastdarm aus festgestellt werden konnte. Auf Druck entleerten sich reichliche Eitermassen durch die Harnröhre. Die Folge waren hartnäckige Fisteln, die ihren Ausgang von der Harnröhre und Prostata nahmen.

Gruppe B. Infektion.

Eine Infektion der harnableitenden Wege gehört zu den häufigsten Erscheinungen, wenn nicht zu allen Verletzungen, die mit einer Harnröhrenzerreißung einhergehen. Mannigfaltig sind die Ursachen, die für die Entstehung einer Infektion angeschuldigt werden können. Die Hauptursache ist die Infektion durch den Katheterismus, den Dauerkatheter und die Möglichkeit der Infektion beim häufigen Bougieren, selbstverständlich spielt die Sauberkeit des Katheterisierens

und Bougierens eine Hauptrolle dabei. Aber selbst bei einwandfreier Asepsis ist die Infektion auf die Dauer nicht zu vermeiden, wegen der Gefahr des Einschleppens von Bakterien aus der Harnröhre in die Blase. Bei anderen Fällen spielt die Hauptrolle die Erschwerung der Harnentleerung, wie sie durch Prostataveränderungen besonders aber durch Harnröhrenstrikturen gegeben ist, oder auch die Störung in der Blasenentleerung, wie wir sie bei der Inkontinenz finden. Bei der Inkontinenz ist es gleichgültig, ob eine Verletzung oder Zerstörung des Blasenschließmuskels oder eine nervöse Störung, Lähmung zugrunde liegt.

Der einfachste Weg führt ascendierend von der Harnröhre zur Entzündung der Blase, der Harnleiter, der Nierenbecken und schließlich zur Veränderung der Nierensubstanz.

Hierunter fallen die Fälle von Urethritis mit Abzößbildung und anschließender Fistelbildung, zu denen auch gelegentlich eine Orchitis und Epididymitis hinzu tritt, wie im Fall 1, Fall 3, Fall 13, Fall 14.

Nicht selten tritt bei Blasenentzündung trotz reichlicher Verabfolgung von Harnantiseptics und Blasenpülungen eine hämorrhagische Cystitis auf, wie im Fall 9.

In schweren Fällen kommt es zur nekrotisierenden Cystitis mit nachfolgender Schrumpfbhase (Fall 5). In anderen Fällen tritt die Verminderung des Blasenfaßungsvermögens, 100 ccm oder sogar weniger, besonders in Erscheinung, die jedoch durch entsprechende Behandlung weitgehend gebessert werden kann (Fall 4, Fall 2, Fall 7).

b) Daß es bei der Infektion zur Prostatitis kommen kann beweist neben Fall 3 (vgl. Gruppe A. Anhang), Fall 1, wo bei der Sektion auch eine Entzündung der Prostata und Samenblase festgestellt wurde.

c) In den meisten Fällen aber bleibt es nicht bei der Blaseninfektion, sondern es beteiligen sich über kurz oder lang die Nieren an den Entzündungsprozessen der unteren Harnwege.

Fall 8. Von der Blase aufsteigend kam es zu einer Infektion der Niere, so daß man von einer rechtsseitigen Pyelonephritis sprechen kann.

Fall 4. Im Anschluß an eine Infektion der unteren Harnwege kam es unter kolikartigen Schmerzen zu einer infizierten Hydronephrose links.

Nicht immer beschränkt sich die Schädigung auf eine Niere.

Fall 7. Durch eine septische Blasenentzündung kam es allmählich zur chronischen Infektion der Nierenbecken und der Nieren.

In fortgeschrittenen Fällen von einseitiger Niereninfektion kann man wegen der Gefahr der sympathischen Infektion der zweiten Niere bei guter Funktion der gefunden zur Exstirpation des erkrankten Organs gezwungen sein (Fall 10).

Die Infektion der Harnwege ist immer eine ernste Erkrankung, der der Arzt seine vollste Aufmerksamkeit schenken muß.

Leider verfügen wir noch nicht über genügend wirksame Mittel, um durch allgemeine und örtliche Behandlung die Infektion restlos zur Ausheilung zu bringen. Blasenpflungen und Instillationen bringen wohl vorübergehende objektive Besserung mit Nachlassen der subjektiven Beschwerden, meist wird die vorübergehende Besserung von Verschlimmerung gefolgt. Auch intravenöse Behandlung (Trypaflavin, Pyridium u. a.) hat nicht zu Dauererfolgen geführt, neuerdings wird von Prontozil Günstiges berichtet. Es fehlt noch an einem Präparat, das an den Nieren selbst ansetzt und im Urin in genügender Konzentration ausgeschieden wird.

In einigen Fällen von schwerer Infektion der Harnwege einschließlich der Nieren hat sich Prof. Bunge die Behandlung mit einer nach besonderem Verfahren hergestellten Autovaccine bewährt mit dem Erfolg, daß der Nierenurin vollständig bakterienfrei wurde, während im Blasenurin Abnahme der Bakterien (Verringerung der Bakterienzahl und der Eiterkörperchen) aber keine vollständige Bakterienfreiheit erreicht wurde bis auf einen Fall, bei dem auch im Blasenurin keine Bakterien mehr nachgewiesen werden konnten.

Ein Versuch der Autovaccinekur erscheint immerhin gerechtfertigt.

Gruppe C. Steinbildungen.

Eine besondere Gefahr der Infektion besteht darin, daß es sekundär infolge der Eiterung zu Steinbildung kommen kann und gerade diese Komplikation ist eine der schwersten, die im Gefolge der Beckenbrüche auftreten und schließlich zum Tode führen kann.

Wenn nach Infektion der harnableitenden Wege die Steinbildung gehäuft auftritt, so begünstigen und unterhalten die gebildeten Steine ihrerseits die Infektion. Es ist daher nicht wunderlich, daß bei den Spätfolgen nach Beckenbrüchen auch die Steinbildung eine große Rolle spielt.

Die Größe der Steine wechselt zwischen Körnern geringer Größe bis zu walnußgroßen und größeren Steingebilden.

a) Bei den Blasensteinen handelt es sich meist um einen Solitärstein wie im Fall 4, Fall 5 und Fall 9, der durch Lithotripsie oder Lithotomie entfernt werden oder aber, wenn er nicht übergroß ist, durch die Harnröhre spontan entleert werden kann.

Fall 5. Um ein eingedrungenes Knochenstück hatte sich in der Blasegend ein Stein gebildet, der operativ entfernt wurde. Öfters war es nicht nur zu plötzlichen Unterbrechungen bei der Miktion gekommen, durch die sich immer neubildenden Blasensteine, sondern auch zu vollständiger Urinverhaltung bei starkem Harndrang. Später wurde ein solcher Blasenstein, der auf den früher gefertigten Röntgenbildern nicht sichtbar war, neben einem paraurethralen Stein gefunden.

b) Es kam zu Erscheinungen des Ventilverschlusses. Eine Steinertrümmerung erwies sich als nicht möglich. Der Zustand wurde ein unerträglicher, so daß operative Abhilfe geschaffen werden mußte. Wie die von Prof. B u n g e vorgenommene Untersuchung ergab, lag der von den früher behandelnden Ärzten als Blasenstein gedeutete Schatten überhaupt nicht in der Blase, sondern paraurethral in einer Höhle, die durch eine Fistel mit der Gegend der Harnröhrenverengung in Verbindung stand.

Beide Steinbildungen konnten operativ entfernt werden. Es erfolgte vollständige Heilung mit Ausheilung der Urineiterfistel in der rechten Unterbauchgend. (Vgl. Gruppe D.)

c) Vielfach sind die in der Blase befindlichen Steine nicht hier selbst entstanden, sondern es handelt sich um herabgewanderte Nierensteine. Eindeutig führt diese Möglichkeit die Tatsache folgenden Falles vor Augen.

Fall 9. Ein Röntgenbild ergab im rechten unteren Nierenkelch einen fast erbsengroßen Nierenstein. Nach einem schweren Kolikanfall ging bei der Harnentleerung auch ein kirschkerngroßer Stein ab. Röntgenologisch war der im unteren Nierenkelche liegende Steinschatten nicht mehr zu sehen.

Ein später entstandener Blasenstein, der operativ entfernt werden mußte, wird wahrscheinlich als Kern einen kleinen, in die Blase gelangten

Nierenstein gehabt haben; da inzwischen röntgenologisch Steinbildung in der linken Niere stattgefunden hatte.

Der Stein in der linken Niere wuchs schließlich zur grotesken Größe heran, füllte das Nierenbecken und die Nierenkelche ganz aus. Später nahm er Hirschgeweihform an, auch bildeten sich in der Nierensubstanz selbst 5 kleinere Steine.

Fall 13. Bei schwerer Infektion hatten sich innerhalb von 6 Monaten 3 Nierensteine gebildet, die wegen Einklemmung im linken Harnleiter operativ beseitigt werden mußten. Später kam es durch einen eingeklemmten, neugebildeten Stein im linken Harnleiter zur Fistelbildung, die ihre Quelle, wie die Röntgenkontrastaufnahme ergab, an dieser Stelle hatte. Die Operation, die zur Exstirpation der linken, geschrumpften Niere notwendig war, bestätigte den erhobenen Befund.

Fall 1. Eine nach schweren rechtsseitigen Kolikanfällen ausgeführte Operation zeigte, daß ein Stein im rechten Harnleiter die Veranlassung zu der hydronephrotischen Schrumpfniere war. Röntgenologisch war dieser Stein nicht nachweisbar.

Wenn auch bei Verletzten mit Beckenbrüchen und Harnröhrenzerreißungen der Zusammenhang zwischen Unfall und nachfolgender Steinbildung nicht geleugnet werden kann, so nimmt ein Fall eine Sonderstellung ein insofern, als durch die Eiter- und Bakterienfreiheit des Urins der Beweis erbracht werden konnte, daß es sich bei der Steinbildung um Ausdruck einer Steindiatheze handelte.

Fall 2. Nach Nierenkoliken entleerte sich zuerst massenhaft Harngrües, später gingen 12 bis erbsengroße Steine durch die Harnröhre ab.

Gruppe D. Fistelbildung.

Zu den Verletzungsfolgen gehören auch die Fisteln. In wenigen Fällen führten konservative Maßnahmen zu ihrer Beseitigung. Vielfach verdanken die Fisteln ihre Entstehung einer Stauung wie im Fall 13 oder einer Abzeßbildung mit erforderlicher Spaltung (vgl. Gruppe A. Anhang) oder einer Urinphlegmone wie sie bei Fall 7 am Unterbauch auftrat oder bei Fall 5, wo zugleich aus der Dammfistel der größte Teil Urin abfloß.

Fall 8. Neben einer Dammfistel bestanden in der linken Gefäßalte noch zwei Fisteln. Aus einer von diesen Fisteln entleerte sich die gleiche Menge Urin am Oberschenkel rechts vorbei wie durch die Harnröhre. Um diese Urinfisteln zum Versiegen zu bringen wurde eine künstliche Blasenfistel geschaffen mit dem Erfolg, daß die Urinentleerung aus der Fistel aufhörte oder sich in erträglichen Grenzen hielt.

Fall 3. Zeitweise bestand eine Blasenfistel neben einer urinösen Dammfistel.

Fall 9. Bei der medikamentösen Spülung der Blase tritt aus der Fistel Spülflüssigkeit aus.

Fall 13. Hier bestand keine Blasenfistel, sondern die Urinfistel oberhalb der Schoßfuge lag im Bereich der Striktur, so daß bei Verschuß dieser Urinfistel Harnverhaltung eintrat.

Fall 14. Außergewöhnlich war die Lage der Fistel, die ihren Ursprung am Übergang von der Harnröhre zur Blase nahm und bei der ein entzündlich geröteter, eingezogener Hof an der rechten Hodensackhälfte ihren Ausgang verriet.

Gruppe E. Inkontinenz.

Zu den Spätfolgen, die den Verletzten besonders feelisch belasten, gehört die Inkontinenz, der unfreiwillige Abgang von Urin. Wenn schon eine gewisse Schwäche des Blasenschließmuskels mit gelegentlich unfreiwilligem Abgang zum Tragen eines Urinfängers zwingt und den Verletzten stark psychisch beeinflußt, so trifft dies noch mehr zu bei völliger Inkontinenz.

Diese kann bedingt sein durch schwere Verletzung des Blasenschließmuskels, die den Schließmuskel außer Tätigkeit setzt, oder sie kann Folge einer Nervenschädigung sein, wenn bei Beckenverletzung gleichzeitig eine Zerreißung der Sacralnerven erfolgt ist wie bei Fall 12 oder eine Leitungsunterbrechung (Narbendruck) im weiteren Verlauf eintritt.

Fall 4. Nach einer Operation trat eine dauernde Inkontinenz ein, die auf Verletzung bzw. vollständiger Zerreißung des Blasenschließmuskels beruhte.

Seltener sind auch die Fälle, wo die Inkontinenz zurückgeführt werden muß auf unvorsichtige oder gewalttätige Bougierung wie im Fall 2 und Fall 14.

Alle diese Kranken werden dauernd zum Tragen eines Urinfängers verurteilt sein.

In geeigneten Fällen wäre der Versuch zu machen, Abhilfe zu schaffen und Kontinenz zu erzielen durch eine Operation nach dem Göbel'schen Prinzip unter Anpassung des Operationsverfahrens an die wesentlich anderen anatomischen Verhältnisse der männlichen Harnröhre. In einigen Fällen scheint dies bereits geglückt zu sein;

doch werden immer die schweren narbigen Veränderungen an der Harnröhre und am Blasenausgang derartigen Bestrebungen bei der Unsicherheit des Erfolges hinderlich im Wege stehen.

Im Vorstehenden ist dargetan, wie schwer die Spätfolgen bei Beckenbrüchen mit gleichzeitiger Verletzung der Harnorgane sein können.

Alle Beckenbrüche mit Harnröhrenverletzungen erfordern aufmerksamste ärztliche Behandlung und Kontrolle, um diese Spätfolgen nach Möglichkeit zu beschränken.

Zum Schlusse möchte ich noch kurz auf die Begutachtung der Harnröhrenverletzungen eingehen. Entsprechend der Schwere der Verletzungsfolgen muß auch zur richtigen Beurteilung der Erwerbsverminderung eine genaue diagnostische Erfassung der Folgeerscheinungen vorausgehen. Aus diesem Grunde soll die endgültige Rentenfestsetzung nicht zu früh erfolgen, da es sich teils um vorübergehende Schädigungen, teils um noch nicht abgeschlossene und unübersehbare Folgen handeln kann. Reparabel sind häufig die Störungen nervöser Art, die bei der Einschätzung gerechter Weise mitberücksichtigt werden müssen, falls durch die Verletzung psychische Veränderungen ausgelöst werden. Andererseits wird die Rente erheblich erhöht werden müssen, wenn zu den entschädigten Unfallsfolgen sekundär weitere Folgen sich einstellen wie z. B. bei Strikturen, Infektion der Harnwege oder auf dem Boden der Infektion Steinbildung.

Bei den Strikturen ist es daher angebracht, die Indikation zur Operation zu erweitern, zumal wenn Neigung zur weiteren Verengerung der Harnröhre vorhanden ist oder es schon zur Harnretention wie bei Fall 11 gekommen ist.

Die unfallbedingte Erwerbsverminderung kann mithin große Schwankungen aufweisen.

Boshammer gibt im einzelnen folgende Sätze als Richtschnur für die Rentenfestsetzung an.

Weite Striktur	10	%
Enge Striktur, die dauernd Behandlung erfordert . . .	20—40	%

Enge Striktur mit Erweiterung des proximalen Urethralabschnittes (Nachträufeln)	25—40%
Enge Striktur mit Cystitis	40—66%
Enge Striktur mit Cystitis und Resturin	80—100%
Striktur mit Dammfistel	30—60%
Häufiges schmerzhaftes Urinieren (ohne Cystitis)	25—33%
Chronische Cystitis leicht	10—20%
Cystitis stärkeren Grades	25—60%
Chronische Infektion der oberen Harnwege	20—40%
Blasensteinbildung	30—60%
Sekundäre infektiöse Nierensteinbildung	30—70%
Nervöse Blasenstörungen	10—70%
Bauchbruch	10—30%
Blasenfistel	30—40%



Zum Schlusse möchte ich nicht veräumen, meinem hochverehrten Lehrer Herrn Professor Dr. B u n g e an dieser Stelle für die Anregung zu dieser Arbeit und für seine wohlwollende Beratung bei der Ausführung den schuldigen Dank auszusprechen.

Schrifttum.

- Boshammer, K.: Über Blasen- und Harnröhrenverletzungen sowie ihre Begutachtung. Der Chirurg, 7. Jahrgang, Heft 22.
- Becker, J.: Über totale Harnröhrenrupturen. Archiv für klinische Chirurgie, Bd. 181. 1935. S. 317.
- Günzler, H.: Über Beckenfrakturen. Bruns Beiträge, Bd. 133. 1925. S. 617.
- Hansen, J.: Erfahrungen und Ergebnisse der Verletzungen der Harnwege. Ergebnisse der Chirurgie und Orthopädie, Bd. 27. 1934. S. 470 ff.
- Hirsch, L.: Über Beckenfrakturen. Bruns Beiträge. Bd. 132. 1924. S. 441.
- Hoppe, O.: Die Beckenbrüche und deren Dauerergebnisse mit besonderer Berücksichtigung bergmännischer Verletzungen. Inaugural-Dissertation, Köln 1932.
- Kaufmann: Verletzungen und Erkrankungen der männlichen Harnröhre. Deutsche Chirurgie. Bd. 50. Stuttgart 1886.
- Kifelev, A.: Zur Frage der Urethraverletzungen bei Beckenknochenfrakturen. Ref. in der Zeitschrift für organische Chirurgie. Bd. 62. S. 134.
- Magnus, G.: Beckenbrüche, Behandlung und Resultate. 55. Tagung der deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Berlin 1931.
- Mörl, F.: Zur Frage der metatraumatischen Nierensteine. Zeitschrift für Urologie. Bd. 27. 1933. S. 607.
- Paal, E.: Beckenbrüche, Behandlung und Resultate. Archiv für Orthopädische Chirurgie. Bd. 30. 1931. S. 495.
- Salleras, J.: Unpaßierbare Strikturen der hinteren Harnröhre durch Bruch des knöchernen Beckens. Ref. in der Zeitschrift für organische Chirurgie. Bd. 45. S. 836.
- Schmidt: Über Behandlung und Dauerergebnisse bei Verletzungen und Verengerungen der männlichen Harnröhre. Beiträge für klinische Chirurgie. Bd. 45. 1905. S. 408.
- Smith and Minz: Rupture of the male urethra. Ref. in der Zeitschrift für organische Chirurgie. Bd. 57. 1932. S. 500.
- Stolper: Die Beckenbrüche mit Bemerkungen über Harnröhren- und Blasenverletzungen. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. Bd. 77. 1905. S. 498.
- Volkmann, J.: Über traumatische Nierensteine. Zentralblatt für Chirurgie. 1930. S. 2651.

Lebenslauf

Am 18. Mai 1907 wurde ich in Duisdorf bei Bonn als Sohn des Volksschullehrers Johannes B a r t h und seiner Ehefrau Magdalena geborene Liethert geboren. Zuerst besuchte ich die Volksschule in Duisdorf, dann die Vorschule und das Staatliche Beethoven-Gymnasium in Bonn und legte am Städtischen Gymnasium in Rheinbach die Reifeprüfung ab. Von 1930 an studierte ich an der Universität in Bonn Medizin, wo ich im Frühjahr 1933 die ärztliche Vorprüfung bestand. Während der klinischen Semester studierte ich in Bonn und München und bestand am 27. Januar 1936 in Bonn das medizinische Staatsexamen.
